



定点医療機関 あたりの報告数 (※)	年間を通して流行する感染症								今流行している感染症							
	新型コロナ				感染性胃腸炎				RSウイルス				ヘルパンギーナ			
	5/8 ~5/14	~5/21	~5/28	~6/4	5/8 ~5/14	~5/21	~5/28	~6/4	5/8 ~5/14	~5/21	~5/28	~6/4	5/8 ~5/14	~5/21	~5/28	~6/4
松戸保健所管内 (松戸、流山、我孫子)	3.92	3.33	7.96	9.29	7.60	9.40	10.20	11.07	0.60	0.80	1.93	2.53	0.07	0.27	0.60	1.80
定点医療機関数	24				15				15				15			
前週比	—	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑
コメント	千葉県、東京都と比較して報告数が多いです。重症化リスクの高い方は特に注意しましょう。				過去5年で最多の報告数です。塩素系漂白剤での消毒が有効です。				例年より早く増えています。ゼーゼー、ヒューヒューする呼吸には注意が必要です。				週に倍以上増えています。のどの強い痛みが特徴です。脱水に気を付けましょう。			
千葉県	3.08	3.97	5.25	6.66	5.63	7.33	7.82	8.21	0.50	0.89	1.17	1.60	0.20	0.48	1.22	2.22
前週比	—	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
東京都	2.40	3.54	3.96	5.29	5.87	7.39	7.46	7.68	0.36	0.65	1.12	1.39	0.25	0.62	1.28	2.44
前週比	—	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

※定点医療機関あたりの報告数とは、定点医療機関(あらかじめ指定された医療機関)から報告された感染者数を定点医療機関数で割った数のことです。地域ごとの流行の状況を推定することができます。

コロナの感染者数が増えています

■体がだるい、熱がある、のどに違和感があるなど、いつもと体調が異なる時は、無理をしないようにしましょう。

■換気、手洗い・手指消毒、せきエチケットなど基本的な感染対策を心がけましょう。

感染対策は



個人の判断を尊重

【新型コロナワクチン】12歳以上の初回(1・2回目)接種のワクチンの種類が変わります

- 7月からは、武田社ワクチン(ノババックス)になります。
- 6・7月の初回(1・2回目)接種会場はキテミテマツドです。

実施日時	使用ワクチン
6月24日(土)15時から	従来型ファイザー
7月 8日(土)15時30分から	ノババックス
7月22日(土)15時30分から	ノババックス

※1回目と2回目で異なるワクチンを接種することは可能です。その場合、27日の間隔を空けてください。
 ※8月以降の予定は決定次第お知らせします。

県内で4年ぶりに麻疹(はしか)の感染が確認されました

全国各地で麻疹患者の発生が確認されています。麻疹は空気感染、飛沫感染、接触感染します。ワクチンを2回接種したことがない方やこれまでに麻疹にかかったことがない方は感染するリスクがあります。

症状

発熱、せき、鼻水などのかぜ症状が2~3日続いた後に、39℃以上の高熱と発疹が現れます。

予防方法

手洗い、マスクのみでは予防できません。麻疹の予防接種が最も有効な予防法です。2回接種していない方は接種をご検討ください。

麻疹の怖さ

- 感染力が強く、麻疹の免疫がない集団に1人の発症者がいたとすると、12~14人の人が感染します。(インフルエンザでは1~2人)
- 免疫を持っていない人がかかると、ほぼ100%発症します。
- 発症した人の30%は肺炎などの合併症を起こします。脳炎を合併し、死に至ることもあります。

麻疹を疑われる症状がある場合

麻疹の疑いがあることを医療機関に電話等で伝え、受診の要否等を確認してからその指示に従ってください。移動される際は、公共交通機関の利用を可能な限り避けてください。