

## 【胃癌】

| レジメン名称                    | 使用薬剤                | 投与<br>経路       | 投与量                                                                | 投与日                     | 1クール | 備考 |
|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----|
| Nab-PTX(添)                | nabPTX              | 注射             | 260mg/m <sup>2</sup>                                               | day1                    | 21日  |    |
| <初回>Nab-PTX+HER           | nabPTX<br>HER       | 注射             | 260mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg                                     | day1<br>day1            | 21日  |    |
| <2回目～>Nab-PTX+HER         | nabPTX<br>HER       | 注射             | 260mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg                                     | day1<br>day1            | 21日  |    |
| RAM+nabPTX                | RAM<br>nabPTX       | 注射<br>注射       | 8mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup>                                     | day1,15<br>day1,8,15    | 28日  |    |
| CDDP腹腔内投与                 | CDDP                | 注射             | 10mg/body                                                          | day1                    |      |    |
| DCF                       | DTX<br>CDDP<br>5-FU | 注射             | 75mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup><br>750mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1-5  | 21日  |    |
| <初回>SP3+HER               | CDDP<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 60mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg<br>S1投与量                             | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |    |
| <2回目～>SP3+HER             | CDDP<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 60mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>S1投与量                             | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |    |
| <初回>XP+HER                | CDDP<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 60mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg<br>Xe投与量                             | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |    |
| <2回目～>XP+HER              | CDDP<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 60mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>Xe投与量                             | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |    |
| 4W CDDP(d1)+CPT-11(d1,15) | CDDP<br>CPT-11      | 注射             | 80mg/m <sup>2</sup><br>70mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1,15         | 28日  |    |
| 2W CDDP+CPT-11            | CDDP<br>CPT-11      | 注射             | 30mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1            | 14日  |    |
| SP3(CDDP+TS-1)            | CDDP<br>S1          | 注射<br>内服       | 60mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                       | day1<br>day1-14         | 21日  |    |
| SP5(CDDP+TS-1)            | CDDP<br>S1          | 注射<br>内服       | 60mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                       | day8<br>day1-21         | 35日  |    |
| XP                        | CDDP<br>Cape        | 注射<br>内服       | 80mg/m <sup>2</sup><br>C法                                          | day1<br>day1-14         | 21日  |    |
| エンハーツ(添)                  | T-DXd               | 注射             | 6.4mg/kg                                                           | day1                    | 21日  |    |
| DTX                       | DTX                 | 注射             | 75mg/m <sup>2</sup>                                                | day1                    | 21日  |    |
| <初回>DTX+HER               | DTX<br>HER          | 注射             | 75mg/m <sup>2</sup><br>8mg/m <sup>2</sup>                          | day1<br>day1            | 21日  |    |
| <2回目～>DTX+HER             | DTX<br>HER          | 注射             | 75mg/m <sup>2</sup><br>6mg/m <sup>2</sup>                          | day1<br>day1            | 21日  |    |

## 【胃癌】

| レジメン名称                 | 使用薬剤                                               | 投与<br>経路       | 投与量                                                     | 投与日                                                             | 1クール | 備考                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| DTX+S-1                | DTX<br>S1                                          | 注射<br>内服       | 40mg/㎡<br>S1投与量                                         | day1<br>day1-14                                                 | 21日  |                                           |
| <初回>mFOLFOX6+HER       | HER<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射             | 8 or 6mg/kg<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡ | day1,22<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29 | 42日  | day22のHERは6mg/kg<br>インフューザーポンプ使用          |
| <2回目～>mFOLFOX6+HER     | HER<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射             | 6mg/kg<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡      | day1,22<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29 | 42日  | インフューザーポンプ使用                              |
| mFOLFOX6+Nivo          | NIVO<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射             | 240mg/body<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡  | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1                            | 14日  | インフューザーポンプ使用                              |
| <初回><br>mFOLFOX6+ビロイ   | Zol<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射             | 800mg/㎡<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡     | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1                            | 14日  | 【HER2陰性・CLDN18.2陽性<br>胃癌】<br>インフューザーポンプ使用 |
| <2回目～><br>mFOLFOX6+ビロイ | Zol<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射             | 400mg/㎡<br>85mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡     | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1                            | 14日  | インフューザーポンプ使用                              |
| <OX終了後><br>sLV5FU2+ビロイ | Zol<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)           | 注射             | 400mg/㎡<br>200mg/㎡<br>400mg/㎡<br>2400mg/㎡               | day1<br>day1<br>day1<br>day1                                    | 14日  | インフューザーポンプ使用<br>L-OHPは最大4サイクルまで           |
| <初回>3W IRIS+HER        | CPT-11<br>HER<br>S1                                | 注射<br>注射<br>内服 | 150mg/㎡<br>8mg/kg<br>S1投与量                              | day1<br>day1<br>day1-14                                         | 21日  |                                           |
| <2回目～>3W IRIS+HER      | CPT-11<br>HER<br>S1                                | 注射<br>注射<br>内服 | 150mg/㎡<br>6mg/kg<br>S1投与量                              | day1<br>day1<br>day1-14                                         | 21日  |                                           |
| <初回>G-SOX+HER          | L-OHP<br>HER<br>S1                                 | 注射<br>注射<br>内服 | 100mg/㎡<br>8mg/kg<br>S1投与量                              | day1<br>day1<br>day1-14                                         | 21日  |                                           |

## 【胃癌】

| レジメン名称               | 使用薬剤                 | 投与経路           | 投与量                                         | 投与日                     | 1クール | 備考               |
|----------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------|------|------------------|
| <2回目～>G-SOX+HER      | L-OHP<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 100mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>S1投与量     | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |
| <初回>SOX+HER          | L-OHP<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 130mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg<br>S1投与量     | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |
| <2回目～>SOX+HER        | L-OHP<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 130mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>S1投与量     | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |
| <初回>XELOX+HER        | L-OHP<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 130mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg<br>Xe投与量     | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |
| <2回目～>XELOX+HER      | L-OHP<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 130mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg<br>Xe投与量     | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |
| <初回>Weekly PTX+HER   | PTX<br>HER           | 注射             | 80mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg               | day1,8,15<br>day1       | 28日  |                  |
| <2回目～>Weekly PTX+HER | PTX<br>HER           | 注射             | 80mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg               | day1,8,15<br>day1       | 28日  |                  |
| <初回>S1+HER           | HER<br>S1            | 注射<br>内服       | 8mg/kg<br>S1投与量                             | day1,22<br>day1-28      | 42日  | day22のHERは6mg/kg |
| <2回目～>S1+HER         | HER<br>S1            | 注射<br>内服       | 6mg/kg<br>S1投与量                             | day1,22<br>day1-28      | 42日  |                  |
| CPT-11+RAM           | RAM<br>CPT-11        | 注射<br>注射       | 8mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>              | day1,15<br>day1,15      | 28日  |                  |
| 4W CPT-11(3投1休)      | CPT-11               | 注射             | 100mg/m <sup>2</sup>                        | day1,8,15               | 28日  |                  |
| 2W CPT-11            | CPT-11               | 注射             | 150mg/m <sup>2</sup>                        | day1                    | 14日  |                  |
| <初回>2W CPT-11+HER    | CPT-11<br>HER        | 注射             | 150mg/m <sup>2</sup><br>8mg/kg              | day1,15,29<br>day1,22   | 42日  | day22のHERは6mg/kg |
| <2回目～>2W CPT-11+HER  | CPT-11<br>HER        | 注射             | 150mg/m <sup>2</sup><br>6mg/kg              | day1,15,29<br>day1,22   | 42日  |                  |
| 5W IRIS              | CPT-11<br>S1         | 注射<br>内服       | 80mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                | day1,15<br>day1-21      | 35日  |                  |
| 3W IRIS              | CPT-11<br>S1         | 注射<br>内服       | 150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量               | day1<br>day1-14         | 21日  |                  |
| オプジーボ(添) 240mg q2W   | NIVO                 | 注射             | 240mg/body                                  | day1                    | 14日  |                  |
| オプジーボ(添) 480mg q4W   | NIVO                 | 注射             | 480mg/body                                  | day1                    | 28日  |                  |
| G-SOX+Nivo           | NIVO<br>L-OHP<br>S1  | 注射<br>注射<br>内服 | 360mg/body<br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                  |

## 【胃癌】

| レジメン名称            | 使用薬剤                  | 投与経路           | 投与量                                                   | 投与日                     | 1クール | 備考                          |
|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|
| XELOX+Nivo        | NIVO<br>L-OHP<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 360mg/body<br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量           | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                             |
| SOX               | L-OHP<br>S1           | 注射<br>内服       | 130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1<br>day1-14         | 21日  |                             |
| G-SOX             | L-OHP<br>S1           | 注射<br>内服       | 100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1<br>day1-14         | 21日  |                             |
| <初回>G-SOX+ビロイ     | Zol<br>L-OHP<br>S1    | 注射<br>注射<br>内服 | 800mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  | 【HER2陰性・CLDN18.2陽性胃癌】       |
| <2回目～>G-SOX+ビロイ   | Zol<br>L-OHP<br>S1    | 注射<br>注射<br>内服 | 600mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  | 化学療法委員会審議よりG-SOX+ビロイも可として登録 |
| <OX終了後>S-1+ビロイ    | Zol<br>S1             | 注射<br>内服       | 600mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1<br>day1-14         | 21日  | L-OHPは最大8サイクルまで             |
| XELOX             | L-OHP<br>Cape         | 注射<br>内服       | 130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量                         | day1<br>day1-14         | 21日  |                             |
| XELOX+Pembro(KEY) | KEY<br>L-OHP<br>Cape  | 注射<br>注射<br>内服 | 200mg/body<br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量           | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                             |
| <初回>XELOX+ビロイ     | Zol<br>L-OHP<br>Cape  | 注射<br>注射<br>内服 | 800mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量 | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  | 【HER2陰性・CLDN18.2陽性胃癌】       |
| <2回目～>XELOX+ビロイ   | Zol<br>L-OHP<br>Cape  | 注射<br>注射<br>内服 | 600mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量 | day1<br>day1<br>day1-14 | 21日  |                             |
| <OX終了後>Cape+ビロイ   | Zol<br>Cape           | 注射<br>内服       | 600mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量                         | day1<br>day1-14         | 21日  |                             |
| Weekly PTX        | PTX                   | 注射             | 80mg/m <sup>2</sup>                                   | day1,8,15               | 28日  |                             |
| Triweekly PTX     | PTX                   | 注射             | 210mg/m <sup>2</sup>                                  | day1                    | 21日  |                             |
| RAM+PTX           | RAM<br>PTX            | 注射             | 8mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>                         | day1,15<br>day1,8,15    | 28日  |                             |
| RAM+TAS102        | RAM<br>TAS-102        | 注射<br>内服       | 8mg/kg<br>TAS102投与量                                   | day1,15<br>day1-5,8-12  | 28日  |                             |
| RAM(添)            | RAM                   | 注射             | 8mg/kg                                                | day1                    | 14日  |                             |

## 【胃癌】

| レジメン名称                             | 使用薬剤                                                     | 投与<br>経路             | 投与量                                                                                                                       | 投与日                                                                        | 1クール | 備考                               |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
| <初回>mFOLFOX6<br>+Pembro(KEY)+HER   | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射                   | 200mg/body<br>8 or 6mg/kg<br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1,22<br>day1,22<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29 | 42日  | day22のHERは6mg/kg<br>インフューザーポンプ使用 |
| <2回目～>mFOLFOX6<br>+Pembro(KEY)+HER | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射                   | 200mg/body<br>6mg/kg<br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>      | day1,22<br>day1,22<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29<br>day1,15,29 | 42日  | インフューザーポンプ使用                     |
| <初回>G-SOX<br>+Pembro(KEY)+HER      | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>S1                                | 注射<br>注射<br>注射<br>内服 | 200mg/body<br>8mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                     | day1<br>day1<br>day1<br>day1-14                                            | 21日  |                                  |
| <2回目～>G-SOX<br>+Pembro(KEY)+HER    | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>S1                                | 注射<br>注射<br>注射<br>内服 | 200mg/body<br>6mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                     | day1<br>day1<br>day1<br>day1-14                                            | 21日  |                                  |
| <初回>XELOX<br>+Pembro(KEY)+HER      | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>Cape                              | 注射<br>注射<br>注射<br>内服 | 200mg/body<br>8mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量                                                                     | day1<br>day1<br>day1<br>day1-14                                            | 21日  |                                  |
| <2回目～>XELOX<br>+Pembro(KEY)+HER    | KEY<br>HER<br>L-OHP<br>Cape                              | 注射<br>注射<br>注射<br>内服 | 200mg/body<br>6mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>Xe投与量                                                                     | day1<br>day1<br>day1<br>day1-14                                            | 21日  |                                  |

## 【食道癌】

| レジメン名称                    | 使用薬剤                                       | 投与経路     | 投与量                                                                                          | 投与日                            | 1クール | 備考           |
|---------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|--------------|
| DC(DTX+CDDP)              | DTX<br>CDDP                                | 注射       | 75mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup>                                                   | day1<br>day1                   | 21日  |              |
| DCF                       | DTX<br>CDDP<br>5-FU                        | 注射       | 75mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup><br>750mg/m <sup>2</sup>                           | day1<br>day1<br>day1-5         | 21日  |              |
| FP(CDDP+5FU)放射線なし         | CDDP<br>5-FU                               | 注射       | 80mg/m <sup>2</sup><br>800mg/m <sup>2</sup>                                                  | day1<br>day1-5                 | 21日  |              |
| FP+RT①(JCOG9708)          | CDDP<br>5-FU                               | 注射       | 70mg/m <sup>2</sup><br>700mg/m <sup>2</sup>                                                  | day1<br>day1-5                 | 28日  |              |
| FP+RT②(JCOG9906)          | CDDP<br>5-FU                               | 注射       | 40mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup>                                                  | day1,8<br>day1-5,8-12          | 28日  |              |
| FP(CDDP+5FU)+KEY<br>放射線なし | KEY<br>CDDP<br>5-FU                        | 注射       | 200mg/body<br>80mg/m <sup>2</sup><br>800mg/m <sup>2</sup>                                    | day1<br>day1<br>day1-5         | 21日  |              |
| DTX(添)                    | DTX                                        | 注射       | 70mg/m <sup>2</sup>                                                                          | day1                           | 21日  |              |
| DTX+NDP                   | DTX<br>NDP                                 | 注射       | 30mg/m <sup>2</sup><br>40mg/m <sup>2</sup>                                                   | day1<br>day1                   | 14日  |              |
| DTX+S1                    | DTX<br>S1                                  | 注射<br>内服 | 20mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                 | day1,8<br>day1-14              | 28日  |              |
| NDP+5FU                   | NDP<br>5-FU                                | 注射       | 80～100mg/m <sup>2</sup><br>800mg/m <sup>2</sup>                                              | day1<br>day1-5                 | 28日  |              |
| NDP+5FU+RT                | NDP<br>5-FU                                | 注射       | 40mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup>                                                  | day1,8<br>day1-4,8-11          | 28日  |              |
| mFOLFOX6                  | L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射       | 85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用 |
| NDP(添)                    | NDP                                        | 注射       | 80～100mg/m <sup>2</sup>                                                                      | day1                           | 28日  |              |
| オプジーボ(添) 240mg q2W        | NIVO                                       | 注射       | 240mg/body                                                                                   | day1                           | 14日  |              |
| オプジーボ(添) 480mg q4W        | NIVO                                       | 注射       | 480mg/body                                                                                   | day1                           | 28日  |              |
| Nivo+DCF                  | NIVO<br>DTX<br>CDDP<br>5-FU                | 注射       | 480mg/body<br>75mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup><br>750mg/m <sup>2</sup>             | day1<br>day1<br>day1<br>day1-5 | 28日  |              |
| WeeklyPTX                 | PTX                                        | 注射       | 80～100mg/m <sup>2</sup>                                                                      | day1,8,15,22,29,36             | 49日  |              |
| PTX+TS-1                  | PTX<br>S1                                  | 注射<br>内服 | 80mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                 | day1,8<br>day1-14              | 21日  |              |

【食道癌】

| レジメン名称                        | 使用薬剤 | 投与<br>経路 | 投与量        | 投与日  | 1クール | 備考 |
|-------------------------------|------|----------|------------|------|------|----|
| キイトルーダ(添)200mg q3W<br>[扁平上皮癌] | KEY  | 注射       | 200mg/body | day1 | 21日  |    |
| キイトルーダ(添)400mg q6W<br>[扁平上皮癌] | KEY  | 注射       | 400mg/body | day1 | 42日  |    |

## 【肝細胞癌】

| レジメン名称                     | 使用薬剤         | 投与経路     | 投与量                       | 投与日                        | 1クール | 備考                  |
|----------------------------|--------------|----------|---------------------------|----------------------------|------|---------------------|
| ATZ+BV                     | ATZ<br>BV    | 注射<br>注射 | 1200mg/body<br>15mg/kg    | day1<br>day1               | 21日  |                     |
| LowdoseFP肝動注               | CDDP<br>5-FU | 注射       | 10mg/body<br>250mg/body   | day1-5,8-12<br>day1-5,8-12 | 21日  |                     |
| イミフィンジ【30kg超】              | DUR          | 注射       | 1500mg/body               | day1                       | 28日  |                     |
| イジュド+イミフィンジ<br>【30kg超】     | TRE<br>DUR   | 注射<br>注射 | 300mg/body<br>1500mg/body | day1<br>day1               | 28日  |                     |
| 5-FU持続                     | 5-FU         | 注射       | 450mg/m <sup>2</sup>      | day1-5                     | 28日  |                     |
| ヤーボイ+オプジーボ<br>[Ipi + Nivo] | Ipi<br>NIVO  | 注射<br>注射 | 80mg/body<br>3mg/kg       | day1<br>day1               | 21日  | 5サイクル目以降は<br>NIVO単剤 |
| RAM                        | RAM          | 注射       | 8mg/kg                    | day1                       | 14日  |                     |

## 【胆道癌・胆管癌】

| レジメン名称                   | 使用薬剤               | 投与経路           | 投与量                                                         | 投与日                      | 1クール | 備考             |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----------------|
| CDDP+GEM                 | CDDP<br>GEM        | 注射             | 25mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup>                | day1,8<br>day1,8         | 21日  |                |
| GC+イミフィンジ【導入療法】          | DUR<br>CDDP<br>GEM | 注射             | 1500mg/body<br>25mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1,8<br>day1,8 | 21日  |                |
| GC+Pembro(KEY)<br>【導入療法】 | KEY<br>CDDP<br>GEM | 注射             | 200mg/body<br>25mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup>  | day1<br>day1,8<br>day1,8 | 21日  | 導入療法 = 最大8サイクル |
| G+Pembro(KEY)<br>【維持療法】  | KEY<br>GEM         | 注射             | 200mg/body<br>1000mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1,8           | 21日  |                |
| GCS                      | CDDP<br>GEM<br>S1  | 注射<br>注射<br>内服 | 25mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量       | day1<br>day1<br>day1-7   | 14日  |                |
| イミフィンジ【維持療法】             | DUR                | 注射             | 1500mg/body                                                 | day1                     | 28日  |                |
| 3投1休 GEM(添)              | GEM                | 注射             | 1000mg/m <sup>2</sup>                                       | day1,8,15                | 28日  |                |
| CPT-11+GEM               | CPT-11<br>GEM      | 注射             | 100mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup>               | day1,8<br>day1,8         | 21日  |                |
| GEM(d8,15)+TS-1          | GEM<br>S1          | 注射<br>内服       | 1000mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                              | day8,15<br>day1-14       | 21日  |                |
| GEM(d1,8)+TS-1           | GEM<br>S1          | 注射<br>内服       | 1000mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                              | day1,8<br>day1-14        | 21日  |                |

【膵臓癌】

| レジメン名称          | 使用薬剤                                                 | 投与経路           | 投与量                                                                                                                  | 投与日                                  | 1クール | 備考           |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------|
| nabPTX+GEM(添)   | nabPTX<br>GEM                                        | 注射             | 125mg/m <sup>2</sup><br>1000mg/m <sup>2</sup>                                                                        | day1,8,15<br>day1,8,15               | 28日  |              |
| GEM(添)+タルセバ     | GEM<br>Erlo                                          | 注射             | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100mg/body                                                                                  | day1,8,15<br>連日                      | 28日  |              |
| FOLFIRINOX      | L-OHP<br>I-LV<br>CPT-11<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射             | 85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>180mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日  | インフューザーポンプ使用 |
| mFFX            | L-OHP<br>I-LV<br>CPT-11<br>5-FU(46hr)                | 注射             | 85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1<br>day1         | 14日  | インフューザーポンプ使用 |
| nal-IRI+5FU/LV  | nal-IRI<br>I-LV<br>5-FU(46hr)                        | 注射             | 70mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                                                 | day1<br>day1<br>day1                 | 14日  | インフューザーポンプ使用 |
| GEM(添)          | GEM                                                  | 注射             | 1000mg/m <sup>2</sup>                                                                                                | day1,8,15                            | 28日  |              |
| GEM(d8,15)+TS-1 | GEM<br>S1                                            | 注射<br>内服       | 1000mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                                       | day8,15<br>day1-14                   | 21日  |              |
| S-IROX          | L-OHP<br>CPT-11<br>S1                                | 注射<br>注射<br>内服 | 85mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                                                                 | day1<br>day1<br>day1-7               | 14日  |              |

## 【大腸癌】

| レジメン名称                           | 使用薬剤                                                | 投与経路 | 投与量                                                                                                                   | 投与日                                    | 1クール | 備考                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 5FU+RT                           | 5-FU                                                | 注射   | 225mg/m <sup>2</sup>                                                                                                  | day1-5                                 | 7日   | [直腸がん]<br>放射線と併用                               |
| FOLFIRI-2                        | CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)         | 注射   | 150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1<br>day1           | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFIRI-2+ザルトラップ                 | AFL<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射   | 4mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFIRI-2+BV                     | BV<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)   | 注射   | 5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| <初回>FOLFIRI-2+Cmab<br>[weekly]   | Cmab<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 400mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1,8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日  | Cmab day8は250mg/m <sup>2</sup><br>インフューザーポンプ使用 |
| <2回目～>FOLFIRI-2+Cmab<br>[weekly] | Cmab<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1,8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFIRI-2+Pmab                   | Pmab<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFIRI-2+RAM                    | RAM<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)  | 注射   | 8mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFIRI-2+Cmab [q2W]             | Cmab<br>CPT-11<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 500mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |

## 【大腸癌】

| レジメン名称                              | 使用薬剤                                               | 投与経路 | 投与量                                                                                                                  | 投与日                                    | 1クール | 備考                                             |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| FOLFOXIRI                           | CPT-11<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(46hr)              | 注射   | 150mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>3200mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1<br>day1           | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| FOLFOXIRI+BV                        | BV<br>CPT-11<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(46hr)        | 注射   | 5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>3200mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| 5-FU+MMC+RT                         | 5-FU<br>MMC                                        | 注射   | 1000mg/m <sup>2</sup><br>10mg/m <sup>2</sup>                                                                         | day1-4,29-32<br>day1,29                | 45日  | [肛門管がん]<br>放射線と併用                              |
| mFOLFOX6                            | L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)         | 注射   | 85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1<br>day1           | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| mFOLFOX6+BV                         | BV<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr)   | 注射   | 5mg/kg<br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| <初回><br>mFOLFOX6+Cmab<br>[weekly]   | Cmab<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 400mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1,8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日  | Cmab day8は250mg/m <sup>2</sup><br>インフューザーポンプ使用 |
| <2回目～><br>mFOLFOX6+Cmab<br>[weekly] | Cmab<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 250mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1,8<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1 | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| mFOLFOX6+Pmab                       | Pmab<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 6mg/kg<br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |
| mFOLFOX6+Cmab [q2W]                 | Cmab<br>L-OHP<br>I-LV<br>5-FU(Bolus)<br>5-FU(46hr) | 注射   | 500mg/m <sup>2</sup><br>85mg/m <sup>2</sup><br>200mg/m <sup>2</sup><br>400mg/m <sup>2</sup><br>2400mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1<br>day1<br>day1   | 14日  | インフューザーポンプ使用                                   |

## 【大腸癌】

| レジメン名称                      | 使用薬剤                 | 投与経路           | 投与量                                                   | 投与日                                | 1クール | 備考                                   |
|-----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------|
| <初回>CPT-11 A法(添)+Cmab       | Cmab<br>CPT-11       | 注射             | 400mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup>          | day1,8,15,22<br>day1,8,15          | 28日  | Cmab day8,15,22は250mg/m <sup>2</sup> |
| <2回目～>CPT-11 A法(添)+Cmab     | Cmab<br>CPT-11       | 注射             | 250mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup>          | day1,8,15,22<br>day1,8,15          | 28日  |                                      |
| CPT-11(1投1休)+BV             | BV<br>CPT-11         | 注射             | 5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>                        | day1<br>day1                       | 14日  |                                      |
| <初回>CPT-11(1投1休)+Cmab       | Cmab<br>CPT-11       | 注射             | 400mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup>          | day1,8<br>day1                     | 14日  | Cmab day8は250mg/m <sup>2</sup>       |
| <2回目～>CPT-11(1投1休)+Cmab     | Cmab<br>CPT-11       | 注射             | 250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup>          | day1,8<br>day1                     | 14日  |                                      |
| CPT-11(1投1休)+Pmab           | Pmab<br>CPT-11       | 注射             | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup>                        | day1<br>day1                       | 14日  |                                      |
| CPT-11(1投1休)                | CPT-11               | 注射             | 150mg/m <sup>2</sup>                                  | day1                               | 14日  |                                      |
| IRIS                        | CPT-11<br>S1         | 注射<br>内服       | 125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1,15<br>day1-14                 | 28日  |                                      |
| IRIS+BV                     | BV<br>CPT-11<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 5mg/kg<br>125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量               | day1,15<br>day1,15<br>day1-14      | 28日  |                                      |
| IRIS(100)+BV(7.5)           | BV<br>CPT-11<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 7.5mg/kg<br>100mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量             | day1,15<br>day1,15<br>day1-14      | 28日  |                                      |
| <初回>IRIS+Cmab<br>[weekly]   | Cmab<br>CPT-11<br>S1 | 注射<br>注射<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15,22<br>day1,15<br>day1-14 | 28日  | Cmab day8,15,22は250mg/m <sup>2</sup> |
| <2回目～>IRIS+Cmab<br>[weekly] | Cmab<br>CPT-11<br>S1 | 注射<br>注射<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15,22<br>day1,15<br>day1-14 | 28日  |                                      |
| IRIS+Pmab                   | Pmab<br>CPT-11<br>S1 | 注射<br>注射<br>内服 | 6mg/kg<br>125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量               | day1,15<br>day1,15<br>day1-14      | 28日  |                                      |
| 3W IRIS                     | CPT-11<br>S1         | 注射<br>内服       | 150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1<br>day1-14                    | 21日  |                                      |
| 3W IRIS+BV                  | BV<br>CPT-11<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 7.5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量             | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                      |
| <初回>3W IRIS+Cmab            | Cmab<br>CPT-11<br>S1 | 注射<br>注射<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15<br>day1<br>day1-14       | 21日  | Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup>    |
| <2回目～>3W IRIS+Cmab          | Cmab<br>CPT-11<br>S1 | 注射<br>注射<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15<br>day1<br>day1-14       | 21日  |                                      |

## 【大腸癌】

| レジメン名称            | 使用薬剤                   | 投与経路           | 投与量                                                   | 投与日                                | 1クール | 備考                                |
|-------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 3W IRIS+Pmab      | Pmab<br>CPT-11<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量               | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                   |
| IRIS+Cmab[q2W]    | Cmab<br>CPT-11<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 500mg/m <sup>2</sup><br>125mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,15<br>day1,15<br>day1-14      | 28日  |                                   |
| XELIRI            | CPT-11<br>Cape         | 注射<br>内服       | 150mg/m <sup>2</sup><br>C法                            | day1<br>day1-14                    | 21日  |                                   |
| XELIRI+BV         | BV<br>CPT-11<br>Cape   | 注射<br>注射<br>内服 | 7.5mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>C法                | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                   |
| <初回>XELIRI+Cmab   | Cmab<br>CPT-11<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>C法    | day1,8,15,22<br>day1,15<br>day1-14 | 21日  | Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup> |
| <2回目～>XELIRI+Cmab | Cmab<br>CPT-11<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>150mg/m <sup>2</sup><br>C法    | day1,8,15,22<br>day1,15<br>day1-14 | 21日  |                                   |
| XELIRI+Pmab       | Pmab<br>CPT-11<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 6mg/kg<br>150mg/m <sup>2</sup><br>C法                  | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                   |
| MMC+S-1+RT        | MMC<br>S1              | 注射<br>内服       | 10mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                          | day1<br>day1-14                    | 28日  | [直腸・肛門がん]<br>放射線と併用               |
| SOX               | L-OHP<br>S1            | 注射<br>内服       | 130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                         | day1<br>day1-14                    | 21日  |                                   |
| SOX+BV            | BV<br>L-OHP<br>S1      | 注射<br>注射<br>内服 | 7.5mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量             | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                   |
| <初回>SOX+Cmab      | Cmab<br>L-OHP<br>S1    | 注射<br>注射<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15<br>day1<br>day1-14       | 21日  | Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup> |
| <2回目～>SOX+Cmab    | Cmab<br>L-OHP<br>S1    | 注射<br>注射<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量 | day1,8,15<br>day1<br>day1-14       | 21日  |                                   |
| SOX+Pmab          | Pmab<br>L-OHP<br>S1    | 注射<br>注射<br>内服 | 6mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量               | day1<br>day1<br>day1-14            | 21日  |                                   |
| XELOX             | L-OHP<br>Cape          | 注射<br>内服       | 130mg/m <sup>2</sup><br>C法                            | day1<br>day1-14                    | 21日  |                                   |
| <初回>XELOX+Cmab    | Cmab<br>L-OHP<br>Cape  | 注射<br>注射<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>C法    | day1,8,15<br>day1<br>day1-14       | 21日  | Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup> |

## 【大腸癌】

| レジメン名称                           | 使用薬剤                  | 投与経路           | 投与量                                                | 投与日                           | 1クール | 備考                                         |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------|--------------------------------------------|
| <2回目～>XELOX+Cmab                 | Cmab<br>L-OHP<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>130mg/m <sup>2</sup><br>C法 | day1,8,15<br>day1<br>day1-14  | 21日  |                                            |
| XELOX+BV                         | BV<br>L-OHP<br>Cape   | 注射<br>注射<br>内服 | 7.5mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>C法             | day1<br>day1<br>day1-14       | 21日  |                                            |
| XELOX+Pmab                       | Pmab<br>L-OHP<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 6mg/kg<br>130mg/m <sup>2</sup><br>C法               | day1<br>day1<br>day1-14       | 21日  |                                            |
| <初回>S-1(4投2休)+Cmab<br>[weekly]   | Cmab<br>S1            | 注射<br>内服       | 400mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                      | day1,8,15,22,29,36<br>day1-28 | 42日  | Cmab day8,15,22,29,36は250mg/m <sup>2</sup> |
| <2回目～>S-1(4投2休)+Cmab<br>[weekly] | Cmab<br>S1            | 注射<br>内服       | 250mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                      | day1,8,15,22,29,36<br>day1-28 | 42日  |                                            |
| S-1(4投2休)+Cmab[q2W]              | Cmab<br>S1            | 注射<br>内服       | 500mg/m <sup>2</sup><br>S1投与量                      | day1,15,29<br>day1-28         | 42日  |                                            |
| S-1(2投1休)+BV                     | BV<br>S1              | 注射<br>内服       | 7.5mg/kg<br>S1投与量                                  | day1<br>day1-14               | 21日  |                                            |
| S-1(4投2休)+BV                     | BV<br>S1              | 注射<br>内服       | 7.5mg/kg<br>S1投与量                                  | day1,22<br>day1-28            | 42日  |                                            |
| S-1(4投2休)+Pmab                   | Pmab<br>S1            | 注射<br>内服       | 6mg/kg<br>S1投与量                                    | day1,15,29<br>day1-28         | 42日  |                                            |
| <初回>TAS-102+Cmab                 | Cmab<br>TAS-102       | 注射<br>内服       | 400mg/m <sup>2</sup><br>TAS102投与量                  | day1,8,15,22<br>day1-5,8-12   | 28日  | Cmab day8,15,22は250mg/m <sup>2</sup>       |
| <2回目～>TAS-102+Cmab               | Cmab<br>TAS-102       | 注射<br>内服       | 250mg/m <sup>2</sup><br>TAS102投与量                  | day1,8,15,22<br>day1-5,8-12   | 28日  |                                            |
| TAS-102+BV(7.5mg/kg q4W)         | BV<br>TAS-102         | 注射<br>内服       | 7.5mg/kg<br>TAS102投与量                              | day1<br>day1-5,8-12           | 28日  |                                            |
| TAS-102+BV(5mg/kg q2W)           | BV<br>TAS-102         | 注射<br>内服       | 5mg/kg<br>TAS102投与量                                | day1,15<br>day1-5,8-12        | 28日  |                                            |
| TAS-102+Pmab                     | Pmab<br>TAS-102       | 注射<br>内服       | 6mg/kg<br>TAS102投与量                                | day1,15<br>day1-5,8-12        | 28日  |                                            |
| <初回>Cape+Cmab                    | Cmab<br>Cape          | 注射<br>内服       | 400mg/m <sup>2</sup><br>C法                         | day1,8,15<br>day1-14          | 21日  | Cmab day8,15は250mg/m <sup>2</sup>          |
| <2回目～>Cape+Cmab                  | Cmab<br>Cape          | 注射<br>内服       | 250mg/m <sup>2</sup><br>C法                         | day1,8,15<br>day1-14          | 21日  |                                            |
| Cape+BV                          | BV<br>Cape            | 注射<br>内服       | 7.5mg/kg<br>C法                                     | day1<br>day1-14               | 21日  |                                            |
| <初回>Cmab[weekly]                 | Cmab                  | 注射             | 400mg/m <sup>2</sup>                               | day1                          | 7日   |                                            |
| <2回目～>Cmab[weekly]               | Cmab                  | 注射             | 250mg/m <sup>2</sup>                               | day1                          | 7日   |                                            |
| Cmab [q2W]                       | Cmab                  | 注射             | 500mg/m <sup>2</sup>                               | day1                          | 14日  |                                            |

## 【大腸癌】

| レジメン名称                         | 使用薬剤                 | 投与経路           | 投与量                                           | 投与日                        | 1クール | 備考                               |
|--------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------|------|----------------------------------|
| Pmab                           | Pmab                 | 注射             | 6mg/kg                                        | day1                       | 14日  |                                  |
| <初回><br>Cmab + ビ`ラフビ` ± メトビ`   | Cmab<br>Enco<br>Bini | 注射<br>内服<br>内服 | 400mg/m <sup>2</sup><br>300mg/day<br>90mg/day | day1<br>day1-7<br>day1-7   | 7日   | [BRAF変異陽性]                       |
| <2回目～><br>Cmab + ビ`ラフビ` ± メトビ` | Cmab<br>Enco<br>Bini | 注射<br>内服<br>内服 | 250mg/m <sup>2</sup><br>300mg/day<br>90mg/day | day1<br>day1-7<br>day1-7   | 7日   | [BRAF変異陽性]                       |
| Cmab[q2w]<br>+ ビ`ラフビ` ± メトビ`   | Cmab<br>Enco<br>Bini | 注射<br>内服<br>内服 | 500mg/m <sup>2</sup><br>300mg/day<br>90mg/day | day1<br>day1-14<br>day1-14 | 14日  | [BRAF変異陽性]                       |
| <初回><br>パージェタ + HER            | PER<br>HER           | 注射             | 840mg/body<br>8mg/kg                          | day1<br>day1               | 21日  | [ HER2陽性 ]                       |
| <2回目以降><br>パージェタ + HER         | PER<br>HER           | 注射             | 420mg/body<br>6mg/kg                          | day1<br>day1               | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入                  |
| <初回>フェスゴ IN                    | PER/HER              | 注射             | 15mL/body                                     | day1                       | 21日  | [ HER2陽性 ]                       |
| <2回目以降>フェスゴMA                  | PER/HER              | 注射             | 10mL/body                                     | day1                       | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入                  |
| ヤーボイ + オプジーボ                   | Ipi<br>NIVO          | 注射             | 1mg/kg<br>240mg/body                          | day1<br>day1               | 21日  | 4サイクルまでIpi+NIVO<br>5サイクル～NIVO単剤へ |
| オプジーボ(添) 240mg q2W             | NIVO                 | 注射             | 240mg/body                                    | day1                       | 14日  |                                  |
| オプジーボ(添) 480mg q4W             | NIVO                 | 注射             | 480mg/body                                    | day1                       | 28日  |                                  |

## 【乳癌】

| レジメン名称                       | 使用薬剤                 | 投与経路           | 投与量                                                                  | 投与日                         | 1クール | 備考              |
|------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------------|
| nabPTX(添)                    | nabPTX               | 注射             | 260mg/m <sup>2</sup>                                                 | day1                        | 21日  |                 |
| ATZ+nab-PTX                  | ATZ<br>nabPTX        | 注射             | 840mg/body<br>100mg/m <sup>2</sup>                                   | day1,15<br>day1,8,15        | 28日  |                 |
| <初回>nabPTX+3wHER             | HER<br>nabPTX        | 注射             | 8mg/kg<br>260mg/m <sup>2</sup>                                       | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| <2回目～>nabPTX+3wHER           | HER<br>nabPTX        | 注射             | 6mg/kg<br>260mg/m <sup>2</sup>                                       | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| <初回><br>nabPTX+3wHER+パージェタ   | PER<br>HER<br>nabPTX | 注射             | 840mg/body<br>8mg/kg<br>260mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1        | 21日  |                 |
| <2回目～><br>nabPTX+3wHER+パージェタ | PER<br>HER<br>nabPTX | 注射             | 420mg/body<br>6mg/kg<br>260mg/m <sup>2</sup>                         | day1<br>day1<br>day1        | 21日  |                 |
| <初回><br>nabPTX+フェスゴ (IN)     | PER/HER<br>nabPTX    | 注射             | 15mL/body<br>260mg/m <sup>2</sup>                                    | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| <2回目～><br>nabPTX+フェスゴ (MA)   | PER/HER<br>nabPTX    | 注射             | 10mL/body<br>260mg/m <sup>2</sup>                                    | day1<br>day1                | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入 |
| TC(CPA+DTX)                  | CPA<br>DTX           | 注射             | 600mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup>                          | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| <初回>TC+3wHER                 | HER<br>CPA<br>DTX    | 注射             | 8mg/kg<br>600mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup>                | day1<br>day1<br>day1        | 21日  |                 |
| <2回目～>TC+3wHER               | HER<br>CPA<br>DTX    | 注射             | 6mg/kg<br>600mg/m <sup>2</sup><br>75mg/m <sup>2</sup>                | day1<br>day1<br>day1        | 21日  |                 |
| AC(CPA+DXR)                  | CPA<br>DXR           | 注射             | 600mg/m <sup>2</sup><br>60mg/m <sup>2</sup>                          | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| EC(CPA+Epi)                  | CPA<br>Epi           | 注射             | 600mg/m <sup>2</sup><br>90mg/m <sup>2</sup>                          | day1<br>day1                | 21日  |                 |
| FEC                          | CPA<br>Epi<br>5-FU   | 注射             | 500mg/m <sup>2</sup><br>100mg/m <sup>2</sup><br>500mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1        | 21日  |                 |
| CMF                          | CPA<br>MTX<br>5-FU   | 内服<br>注射<br>注射 | 100mg/body<br>40mg/m <sup>2</sup><br>600mg/m <sup>2</sup>            | day1-14<br>day1,8<br>day1,8 | 28日  |                 |
| ダトポタマブ デルクステカン<br>(ダトロウェイ)   | Dato-DXd             | 注射             | 6mg/kg                                                               | day1                        | 21日  |                 |
| エンハーツ(添)                     | T-DXd                | 注射             | 5.4mg/kg                                                             | day1                        | 21日  |                 |
| DTX(添)                       | DTX                  | 注射             | 75mg/m <sup>2</sup>                                                  | day1                        | 21日  |                 |

## 【乳癌】

| レジメン名称                    | 使用薬剤              | 投与経路 | 投与量                                           | 投与日                    | 1クール | 備考              |
|---------------------------|-------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------|------|-----------------|
| <初回>DTX+3wHER             | HER<br>DTX        | 注射   | 8mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>                 | day1<br>day1           | 21日  |                 |
| <2回目～>DTX+3wHER           | HER<br>DTX        | 注射   | 6mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>                 | day1<br>day1           | 21日  |                 |
| <初回><br>DTX+3wHER+パージェタ   | PER<br>HER<br>DTX | 注射   | 840mg/body<br>8mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>   | day1<br>day1<br>day1   | 21日  |                 |
| <2回目～><br>DTX+3wHER+パージェタ | PER<br>HER<br>DTX | 注射   | 420mg/body<br>6mg/kg<br>75mg/m <sup>2</sup>   | day1<br>day1<br>day1   | 21日  |                 |
| <初回><br>DTX+フェスゴ(IN)      | PER/HER<br>DTX    | 注射   | 15mL/body<br>75mg/m <sup>2</sup>              | day1<br>day1           | 21日  |                 |
| <2回目～><br>DTX+フェスゴ(MA)    | PER/HER<br>DTX    | 注射   | 10mL/body<br>75mg/m <sup>2</sup>              | day1<br>day1           | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入 |
| ERB(添)                    | ERB               | 注射   | 1.4mg/m <sup>2</sup>                          | day1,8                 | 21日  |                 |
| <初回>ERB+3wHER             | HER<br>ERB        | 注射   | 8mg/kg<br>1.4mg/m <sup>2</sup>                | day1<br>day1,8         | 21日  |                 |
| <2回目～>ERB+3wHER           | HER<br>ERB        | 注射   | 6mg/kg<br>1.4mg/m <sup>2</sup>                | day1<br>day1,8         | 21日  |                 |
| <初回><br>ERB+3wHER+パージェタ   | PER<br>HER<br>ERB | 注射   | 840mg/body<br>8mg/kg<br>1.4mg/m <sup>2</sup>  | day1<br>day1<br>day1,8 | 21日  |                 |
| <2回目～><br>ERB+3wHER+パージェタ | PER<br>HER<br>ERB | 注射   | 420mg/body<br>6mg/kg<br>1.4mg/m <sup>2</sup>  | day1<br>day1<br>day1,8 | 21日  |                 |
| <2回目><br>ERB+フェスゴ(MA)     | PER/HER<br>ERB    | 注射   | 10mL/body<br>1.4mg/m <sup>2</sup>             | day1<br>day1,8         | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入 |
| <初回><br>ERB+フェスゴ(IN)      | PER/HER<br>ERB    | 注射   | 15mL/body<br>1.4mg/m <sup>2</sup>             | day1<br>day1,8         | 21日  |                 |
| フェスゴ(IN)<br>【維持・再ローディング】  | PER/HER           | 注射   | 15mL/body                                     | day1                   | 21日  |                 |
| フェスゴ(MA)<br>【維持療法】        | PER/HER           | 注射   | 10mL/body                                     | day1                   | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入 |
| GEM(添)                    | GEM               | 注射   | 1250mg/m <sup>2</sup>                         | day1,8                 | 21日  |                 |
| <初回>GEM+3wHER             | HER<br>GEM        | 注射   | 8mg/kg<br>1250mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1,8         | 21日  |                 |
| <2回目～>GEM+3wHER           | HER<br>GEM        | 注射   | 6mg/kg<br>1250mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1,8         | 21日  |                 |
| GT(GEM+PTX)               | GEM<br>PTX        | 注射   | 1250mg/m <sup>2</sup><br>175mg/m <sup>2</sup> | day1,8<br>day1         | 21日  |                 |

## 【乳癌】

| レジメン名称                       | 使用薬剤               | 投与経路           | 投与量                                         | 投与日                       | 1クール | 備考                    |
|------------------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------|
| <初回>WeeklyHER A法             | HER                | 注射             | 4mg/kg                                      | day1                      | 7日   |                       |
| <2回目～>WeeklyHER A法           | HER                | 注射             | 2mg/kg                                      | day1                      | 7日   |                       |
| <初回>3wHER B法                 | HER                | 注射             | 8mg/kg                                      | day1                      | 21日  |                       |
| <2回目～>3wHER B法               | HER                | 注射             | 6mg/kg                                      | day1                      | 21日  |                       |
| HER+パージェタ                    | PER                | 注射             | 420mg/body                                  | day1                      | 21日  |                       |
| 【維持療法】                       | HER                |                | 6mg/kg                                      | day1                      |      |                       |
| HER+パージェタ                    | PER                | 注射             | 840mg/body                                  | day1                      | 21日  |                       |
| 【維持・再ローディング】                 | HER                |                | 8mg/kg                                      | day1                      |      |                       |
| <初回><br>Weekly PTX+PER+HER   | PER<br>HER<br>PTX  | 注射             | 840mg/body<br>8mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1,8,15 | 21日  |                       |
| <2回目～><br>Weekly PTX+PER+HER | PER<br>HER<br>PTX  | 注射             | 420mg/body<br>6mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1,8,15 | 21日  |                       |
| <初回><br>TS-1+3wHER+パージェタ     | PER<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 840mg/body<br>8mg/kg<br>S1投与量               | day1<br>day1<br>day1-14   | 21日  |                       |
| <2回目～><br>TS-1+3wHER+パージェタ   | PER<br>HER<br>S1   | 注射<br>注射<br>内服 | 420mg/body<br>6mg/kg<br>S1投与量               | day1<br>day1<br>day1-14   | 21日  |                       |
| <初回><br>VNR+3wHER+パージェタ      | PER<br>HER<br>VNR  | 注射             | 840mg/body<br>8mg/kg<br>25mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1,8    | 21日  |                       |
| <2回目～><br>VMR+3wHER+パージェタ    | PER<br>HER<br>VNR  | 注射             | 420mg/body<br>6mg/kg<br>25mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1,8    | 21日  |                       |
| <初回><br>Cape+3wHER+パージェタ     | PER<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 840mg/body<br>8mg/kg<br>Xe投与量               | day1<br>day1<br>day1-14   | 21日  |                       |
| <2回目～><br>Cape+3wHER+パージェタ   | PER<br>HER<br>Cape | 注射<br>注射<br>内服 | 420mg/body<br>6mg/kg<br>Xe投与量               | day1<br>day1<br>day1-14   | 21日  |                       |
| <初回><br>3投1休PTX+wHER         | HER<br>PTX         | 注射             | 4mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>               | day1,8,15,22<br>day1,8,15 | 28日  | HER day8,15,22は2mg/kg |
| <2回目～><br>3投1休PTX+wHER       | HER<br>PTX         | 注射             | 2mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>               | day1,8,15,22<br>day1,8,15 | 28日  |                       |
| <初回><br>WeeklyPTX+HER【術後】    | HER<br>PTX         | 注射             | 4mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1              | 7日   |                       |
| <2回目～><br>WeeklyPTX+HER【術後】  | HER<br>PTX         | 注射             | 2mg/kg<br>80mg/m <sup>2</sup>               | day1<br>day1              | 7日   |                       |

## 【乳癌】

| レジメン名称                         | 使用薬剤            | 投与経路     | 投与量                              | 投与日               | 1クール | 備考                          |
|--------------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|-------------------|------|-----------------------------|
| <初回>TS-1+3wHER                 | HER<br>S1       | 注射<br>内服 | 8mg/kg<br>S1投与量                  | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| <2回目～>TS-1+3wHER               | HER<br>S1       | 注射<br>内服 | 6mg/kg<br>S1投与量                  | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| <初回>VNR+3wHER                  | HER<br>VNR      | 注射       | 8mg/kg<br>25mg/m <sup>2</sup>    | day1<br>day1,8    | 21日  |                             |
| <2回目～>VNR+3wHER                | HER<br>VNR      | 注射       | 6mg/kg<br>25mg/m <sup>2</sup>    | day1<br>day1,8    | 21日  |                             |
| <初回>Cape+3wHER                 | HER<br>Cape     | 注射<br>内服 | 8mg/kg<br>Xe投与量                  | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| <2回目～>Cape+3wHER               | HER<br>Cape     | 注射<br>内服 | 6mg/kg<br>Xe投与量                  | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| 3投1休CPT-11(添)                  | CPT-11          | 注射       | 100mg/m <sup>2</sup>             | day1,8,15         | 28日  |                             |
| Weekly PTX                     | PTX             | 注射       | 80mg/m <sup>2</sup>              | day1              | 7日   |                             |
| 3w PTX                         | PTX             | 注射       | 175mg/m <sup>2</sup>             | day1              | 21日  |                             |
| <初回><br>weekly PTX+フェスゴ (IN)   | PER/HER<br>PTX  | 注射       | 15mL/body<br>80mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1,8,15 | 21日  |                             |
| <2回目～><br>weekly PTX+フェスゴ (MA) | PER/HER<br>PTX  | 注射       | 10mL/body<br>80mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1,8,15 | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入             |
| Weekly PTX+BV                  | BV<br>PTX       | 注射       | 10mg/kg<br>90mg/m <sup>2</sup>   | day1<br>day1,8,15 | 28日  |                             |
| <2回目～><br>TS-1+フェスゴ(MA)        | PER/HER<br>S1   | 注射<br>内服 | 10mL/body<br>S1投与量               | day1<br>day1-14   | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入             |
| <初回><br>TS-1+フェスゴ(IN)          | PER/HER<br>S1   | 注射<br>内服 | 15mL/body<br>S1投与量               | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| T-DM1(添)                       | T-DM1           | 注射       | 3.6mg/m <sup>2</sup>             | day1              | 21日  |                             |
| VNR(添)                         | VNR             | 注射       | 25mg/m <sup>2</sup>              | day1,8            | 21日  |                             |
| <初回><br>VNR+フェスゴ (IN)          | PER/HER<br>VNR  | 注射       | 15mL/body<br>25mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1,8    | 21日  |                             |
| <2回目～><br>VNR+フェスゴ (MA)        | PER/HER<br>VNR  | 注射       | 10mL/body<br>25mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1,8    | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入             |
| <初回><br>Cape+フェスゴ(IN)          | PER/HER<br>Cape | 注射<br>内服 | 15mL/body<br>Xe投与量               | day1<br>day1-14   | 21日  |                             |
| <2回目～><br>Cape+フェスゴ(MA)        | PER/HER<br>Cape | 注射<br>内服 | 10mL/body<br>Xe投与量               | day1<br>day1-14   | 21日  | 6W空いたら<初回>から再導入             |
| KEY 400mg q6W                  | KEY             | 注射       | 400mg/body                       | day1              | 42日  | [TNBC 術後]<br>KEY q6W=5コースまで |
| KEY 200mg q3W                  | KEY             | 注射       | 200mg/body                       | day1              | 21日  | [TNBC 術後]<br>KEY q3W=9コースまで |

【乳癌】

| レジメン名称                     | 使用薬剤                | 投与<br>経路 | 投与量                                                       | 投与日                                              | 1クール | 備考                    |
|----------------------------|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------------------|
| KEY+CBDCA+PTX<br>【術前補助①】   | KEY<br>PTX<br>CBDCA | 注射       | 200mg/body<br>80mg/m <sup>2</sup><br>AUC=5                | day1<br>day1,8,15<br>day1                        | 21日  |                       |
| KEY+EC(CPA+Epi)<br>【術前補助②】 | KEY<br>Epi<br>CPA   | 注射       | 200mg/body<br>90mg/m <sup>2</sup><br>600mg/m <sup>2</sup> | day1<br>day1<br>day1                             | 21日  |                       |
| KEY+CBDCA+GEM              | KEY<br>GEM<br>CBDCA | 注射       | 200mg/body<br>1000mg/m <sup>2</sup><br>AUC=2              | day1<br>day1,8<br>day1,8                         | 21日  | [TNBC/PD-L1 CPS ≥ 10] |
| KEY+PTX                    | KEY<br>PTX          | 注射       | 200mg/body<br>90mg/m <sup>2</sup>                         | day1,22,43,64<br>day1,8,15,29,36<br>,43,57,64,71 | 84日  | [TNBC/PD-L1 CPS ≥ 10] |