[MSI-High]

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|------|----------|------------|------|------|----|
| キイトルーダ(添) 200mg/3w | KEY | 注射 | 200mg/body | day1 | 21日 | |
| キイトルーダ(添) 400mg/6w | KEY | 注射 | 400mg/body | day1 | 42日 | |

【メルケル細胞癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------|------|----------|---------|------|------|----|
| バベンチオ | AVE | 注射 | 10mg/kg | day1 | 14日 | |

【悪性黒色腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|------|----------|------------|-------|------|----|
| DTIC | DTIC | 注射 | 250mg/m² | da1-5 | 21日 | |
| ヤーボイ+オプジーボ | lpi | 注射 | 3mg/kg | day1 | 21日 | |
| | NIVO | 注射 | 80mg/body | | 2111 | |
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4w | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |
| キイトルーダ(添) 200mg/3w | KEY | 注射 | 200mg/body | day1 | 21日 | |
| キイトルーダ(添) 400mg/6w | KEY | 注射 | 400mg/body | day1 | 42日 | |

【上皮系皮膚悪性腫瘍】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|------|----------|------------|------|------|----|
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4w | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |

【悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫除く)】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|------|----------|------------|------|------|----|
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |

【悪性軟部腫瘍】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|----------|------|----------|----------|------|------|----|
| ヨンデリス(添) | TRA | 注射 | 1.2mg/m² | day1 | 21日 | |

【横紋筋肉腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-----------------|-------|----------|------------|-----------|------|----|
| | VCR | | 1.5mg/m² | day1,8,15 | | |
| VAC2.2(小児用:>3歳) | ACT-D | 注射 | 0.045mg/kg | day1 | 21日 | |
| | CPA | | 2200mg/m² | day1 | | |

【癌性心膜炎】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------|-------|----------|------------|------|------|----|
| CBDCA 心膜癒着術 | CBDCA | 腔内 | 300mg/body | day1 | 1日 | |

【血管肉腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|------------|------|----------|----------|--------------------|------|-----------------|
| Weekly PTX | PTX | 注射 | 100mg/m² | day1,8,15,22,29,36 | 49日 | PTX:80~100mg/m² |

【原発不明癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|--------------------|--------------|----------|------------|--------------|------|----|
| TC(CBDCA+PTX) | PTX CBDCA | 注射 | | day1 day1 | 21日 | |
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4w | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |

【神経芽細胞腫瘍】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-------------|--------|----------|-----------|-----------|------|---------------|
| | VCR | | 1.4mg/m² | day1 | | |
| VDC | DXR | 注射 | 75mg/m² | day1 | 21日 | VCRは最大2mg/day |
| | СРА | | 1200mg/m² | day1 | | |
| CPT-11+DTX | CPT-11 | 注射 | 50mg/m² | day1,8,15 | 28日 | |
| OL L-II+DIV | DTX | /工列 | 30mg/m² | day1,8,15 | 20 🗆 | |

【神経内分泌腫瘍】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|---------------|--------|----------|----------|-----------|------|----|
| 3投1休CPT-11(添) | CPT-11 | 注射 | 100mg/m² | day1,8,15 | 28日 | |
| ザノサー:5日間連日(添) | STZ | 注射 | 500mg/m² | day1-5 | 42日 | |

【唾液腺癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|-----------------|------------|----------|-------------------|--------------|------|----|
| <初回>DTX+3wHER | DTX HER | 注射 | 70mg/m² 8mg/kg | day1 day1 | 21日 | |
| <2回目~>DTX+3wHER | DTX HER | 注射 | 70mg/m² 6mg/kg | day1 day1 | 21日 | |

【頭頚部癌】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|----------------------|-------|----------|------------|-----------|------|----------------------|
| DTX+CBDCA | DTX | 注射 | 70mg/m² | day1 | 21日 | |
| | CBDCA | | AUC=5 | day1 | 2111 | |
| <初回>DC+Cmab | Cmab | 注射 | 400mg/m² | day1,8,15 | 21日 | |
| | DTX | | 70mg/m² | day1 | | Cmab day8,15は250mg/㎡ |
| | CBDCA | | AUC=5 | day1 | | |
| <2回目~>DC+Cmab | Cmab | 注射 | 250mg/m² | day1,8,15 | 21日 | |
| | DTX | | 70mg/m² | day1 | | |
| | CBDCA | | AUC=5 | day1 | | |
| | KEY | | 200mg/body | day1 | 21日 | 3剤は6サイクルまで |
| KEY+CBDCA+5-FU | CBDCA | 注射 | AUC=5 | day1 | | |
| | 5-FU | | 1000mg/m² | day1-4 | | |
| TC(CBDCA+PTX) | PTX | 注射 | 175mg/m² | day1 | 21日 | |
| TO(OBDOA+FTX) | CBDCA | /土⁄打 | AUC=5 | day1 | 21口 | |
| | Cmab | | 400mg/m² | day1,8,15 | 21日 | |
| <初回>TC+Cmab | PTX | 注射 | 175mg/m² | day1 | | Cmab day8,15は250mg/㎡ |
| | CBDCA | | AUC=5 | day1 | | |
| | Cmab | | 250mg/m² | day1,8,15 | | |
| <2回目~>TC+Cmab | PTX | 注射 | 175mg/m² | day1 | 21日 | |
| | CBDCA | | AUC=5 | day1 | | |
| CDDP+RT | CDDP | 注射 | 100mg/m² | day1 | 21日 | 放射線と併用 |
| DTX+CDDP | DTX | 注射 | 75mg/m² | day1 | 21日 | |
| | CDDP | | 75mg/m² | day1 | | |
| | DTX | 注射 | 75mg/m² | day1 | 21日 | |
| DCF | CDDP | | 75mg/m² | day1 | | |
| | 5-FU | | 750mg/m² | day1-5 | | |
| | CDDP | 注射 | 80mg/m² | day1 | 21日 | |
| FP(CDDP+5-FU) | 5-FU | | 800mg/m² | day1-5 | | |
| | KEY | 注射 | 200mg/body | day1 | 21日 | |
| KEY+CDDP+5-FU | CDDP | | 100mg/m² | day1 | | 3剤は6サイクルまで |
| | 5-FU | | 1000mg/m² | day1-4 | | |
| オプジーボ(添) 240mg q2w | NIVO | 注射 | 240mg/body | day1 | 14日 | |
| オプジーボ(添) 480mg q4w | NIVO | 注射 | 480mg/body | day1 | 28日 | |
| WeeklyPTX+<初回>Cmab | Cmab | 注射 | 400mg/m² | day1 | 7日 | |
| | PTX | | 100mg/m² | day1 | | |
| WeeklyPTX+<2回目~>Cmab | Cmab | 注射 | 250mg/m² | day1 | 7日 | |
| | PTX | | 100mg/m² | day1 | | |
| キイトルーダ(添) 200mg q3w | KEY | 注射 | 200mg/body | day1 | 21日 | |
| キイトルーダ(添) 400mg q6w | KEY | 注射 | 400mg/body | day1 | 42日 | |
| Cmab q2w | Cmab | 注射 | 500mg/m² | day1 | 14日 | |

【軟部肉腫】

| レジメン名称 | 使用薬剤 | 投与 経路 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 備考 |
|------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|------|------------------------------|
| DXR | DXR | 注射 | 75mg/m² | day1 | 21日 | |
| AI(DXR+IFM) | DXR IFM | 注射 | 30mg/m² 2000mg/m² | day1,2 day1-5 | 21日 | |
| テセントリク(添) /成人 | ATZ | 注射 | 1200mg/body | day1 | 21日 | 【胞巣状軟部肉腫】 |
| テセントリク(添) /小児(2歳以上) | ATZ | 注射 | 15mg/kg | day1 | 21日 | 【胞巢状軟部肉腫】 max 1200mg/body |