## 【悪性神経膠腫(成人)】

レジメン名称	使用薬剤	投与 経路	投与量	投与日	1クール	備考
TMZ注初発:RT併用期	TMZ	注射	75mg/m²	day1-14	14日	42日間投与後、4週間休薬 →TMZ単剤へ
BV+TMZ注初発	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:1・2週目	TMZ	注射	75mg/m²	day1-14		
BV+TMZ注初発	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:3・4週目	TMZ	注射	75mg/m²	day1-14		
BV+TMZ注初発	BV	注射	10mg/kg	day1	100	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:5・6週目	TMZ	注射	75mg/m²	day1-14	13日	RT併用期5・6週目(d29~41)
BV+TMZ注初発	BV	注射	10mg/kg	RT終了日	- 日	RT終了日(d42~49)にBV投与
:RT併用期:7週目	TMZ	注射	75mg/m²	~BV投与日		→4週間休薬
BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:1・2週目	TMZ	内服	75mg/m²	day1-14		
BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:3・4週目	TMZ	内服	75mg/m²	day1-14		
BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1	13日	RT=週5日分割照射併用
:RT併用期:5・6週目	TMZ	内服	75mg/m²	day1-14		RT併用期5・6週目(d29~41)
BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1 (=RT終了日)	- 日	RT終了日(d42~49)にBV投与
:RT併用期:7週目	TMZ	内服	75mg/m²	~BV投与日		→4週間休薬
BV+TMZ内服	BV	注射	10mg/kg	day1,15	28日	初発維持は6サイクルまで
:初発維持・再発	TMZ	内服	150~200mg/m²	day1-5		
3週間隔 BV	BV	注射	15mg/kg	day1	21日	
2週間隔 BV	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	

## 【小児脳腫瘍】

May 150mg/m	レジメン名称	使用薬剤	投与	投与量	<b>人</b> 投与日	1クール	備考
BV		区用来用	経路	以子里 	1X子口	17 70	VH <sup>*</sup> つ
BV+TMZ注 150mg/m	TMZ注 単独 150mg/㎡	TMZ	注射	150mg/m²	day1-5	28日	
BV+TMZ注 200mg/m   BV   TMZ   150mg/m   day1-5   day1,15   day1,15   day1-15   day1-5   day1,15   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-5   day1-14   day1-5   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-5   day1-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-5   day1-5   day1-5   day1-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-5   day1-3   day1-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day2-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   RT (Apple of ap1 day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day1-3   day2-3   day2-3   day2-3   day1-3   day2-3   da	BV+TMZ注 150mg/㎡	BV	注射	10mg/kg	day1,15	28日	
BV+TMZ注 200mg/m		TMZ		150mg/m²	day1-5		
TMZ   200mg/m   day1-5   BV   10mg/kg   day1   14日   RT=週5日分割照射併用   RT   RT=週5日分割照射併用   RT   RT=週5日分割照射併用   RT   RT   RT   RT   RT   RT   RT   R	BV+TMZ注 200mg/㎡	BV	注射	10mg/kg	day1,15	28日	
放射線併用1・2週		TMZ		200mg/m²	day1-5		
放射線併用1・2週   TMZ   内服 75mg/m   day1-14   day1-14   RT=週5日分割照射併用   RT#用期5・6週目(d29~4   BV+TMZ内服初発   DM服 75mg/m   day29-41   RT#用期5・6週目(d29~4   BV+TMZ内服初発   DMR 75mg/m   CBV投与日   DMR 75mg/m   CBV 75mg	BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1	110	DT組5口/2到照射/光田
放射線併用3・4週	放射線併用1・2週	TMZ	内服	75mg/m²	day1-14	14 []	NT=200日为高规划开用
放射線併用3・4週 TMZ 内服 75mg/㎡ day15-28 BV+TMZ内服初発	BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day15	110	DT組5口/2到照射/光田
放射線併用5・6週	放射線併用3・4週	TMZ	内服	75mg/m²	day15-28	14口	KT=200日为剖照别讲用
放射線併用5・6週   TMZ   内服   75mg/㎡   day29-41   RT併用期5・6週目(d29~4   BV+TMZ内服初発   注射   10mg/kg	BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day29	12□	RT=週5日分割照射併用
放射線併用7週 TMZ 内服 75mg/㎡ ~BV投与日 一日 →4週間休薬 BV+TMZ内服:初発維持・再発 TMZ 内服 15mg/kg day1.15 day1-5 28日 (BV 15mg/kg 21日) 3週間隔 BV 注射 15mg/kg day1 21日 2週間隔 BV 注射 10mg/kg day1 14日  VCR 1.5mg/㎡ day1,8,15 3000mg/㎡ day1・3 RT+weekly VCR (Packer B: ケモ前RT中) VCR 注射 1.5mg/㎡ day1・3 RTを解析の VCR 注射 1.5mg/㎡ day1・3 RTを引動します。 TF WCR 注射 1.5mg/㎡ day1・3 RTを引動します。 TF WCR 注射 1.5mg/㎡ day2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body 1.5mg/㎡ day2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body May2・8,15 42日 8サイクル繰り返す VCR・最大2mg/body	放射線併用5・6週	TMZ	内服	75mg/m²	day29-41	12口	RT併用期5・6週目(d29~41)
放射線併用7週 TMZ 内服 75mg/㎡ ~BV投与日 →4週間休薬 BV+TMZ内服:初発維持・再発 TMZ 内服 15mg/kg day1.15 day1-5 (BV 15mg/kg 21日) 3週間隔 BV 注射 15mg/kg day1 21日 2週間隔 BV 注射 10mg/kg day1 14日 VCR SIOP-EP1(VCR+ETP+CPA) CPA 注射 3000mg/㎡ day1.3	BV+TMZ内服初発	BV	注射	10mg/kg	day1 (=RT終了日)		RT終了日(d42~49)にBV投与
BV+IMZ内版:初発維持・再発	放射線併用7週	TMZ	内服	75mg/m²	~BV投与日		→4週間休薬
TMZ   内服   I50~200mg/m   day1-5   (BV 15mg/kg 21日)     3週間隔 BV   注射   15mg/kg   day1   21日     2週間隔 BV   注射   10mg/kg   day1   14日     VCR   1.5mg/m   day1,8,15   day1   28日   VCR-最大2mg/body     RT+weekly VCR (Packer B: ケモ前RT中)   VCR   注射   1.5mg/m   day1   7日   VCR-最大2mg/body     Packer Bレジメン	DV. TM7内限·切及维持,再及	BV	注射	10mg/kg	day1,15	20 🗆	6サイクル後BV単剤維持へ
2週間隔 BV   注射   10mg/kg   day1   14日   1.5mg/m   day1,8,15   day1   28日   VCR-最大2mg/body   1.5mg/m   day1-3   VCR   注射   1.5mg/m   day1-3   VCR-最大2mg/body   1.5mg/m   day1   7日   VCR-最大2mg/body   VCR   では、	BV+ MZ内版:初発維持・冉発 	TMZ	内服	150~200mg/m²	day1-5	20 🏻	(BV 15mg/kg 21日)
SIOP-EP1(VCR+ETP+CPA)       VCR	3週間隔 BV	BV	注射	15mg/kg	day1	21日	
SIOP-EP1(VCR+ETP+CPA)	2週間隔 BV	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	
RT+weekly VCR (Packer B: ケモ前RT中)       VCR       注射       1.5mg/㎡       day1       7日       VCR-最大2mg/body         Packer Bレジメン [BSA=1.0/㎡程度]       CDDP VCR 注射       75mg/㎡ day2,8,15 day2,8,15 day22,23       42日       8サイクル繰り返す VCR-最大2mg/body	SIOP-EP1(VCR+ETP+CPA)	VCR	注射	1.5mg/m²	day1,8,15	28日	
RT+weekly VCR (Packer B: ケモ前RT中)  CDDP Packer Bレジメン 【BSA=1.0/㎡程度】  CDDP VCR 注射 1.5mg/㎡ day1  day1  Ady1  RT終了6週間後に開始 1.5mg/㎡ day2,8,15 Ady2,8,15 Ady2,23  VCR-最大2mg/body		CPA		3000mg/m²	day1		VCR-最大2mg/body
(Packer B: ケモ前RT中)       VCR       注射       1.5mg/㎡       day1       7日       VCR-最大2mg/body         Packer Bレジメン 【BSA=1.0/㎡程度】       CDDP VCR CPA       75mg/㎡       day1 day2,8,15 day2,8,15 day22,23       RT終了6週間後に開始 8サイクル繰り返す VCR-最大2mg/body		ETP		100mg/m²	day1-3		
(Packer B: ケモ前RT中)       CDDP       75mg/㎡       day1       RT終了6週間後に開始         Packer Bレジメン 【BSA=1.0/㎡程度】       VCR       注射       1.5mg/㎡       day2,8,15       42日       8サイクル繰り返す         CPA       1.5mg/㎡       day22,23       VCR-最大2mg/body	RT+weekly VCR	VCD	⇒☆	1 5 mg/m²	dov1	7 🗆	\/OD ■ ± 2
Packer Bレジメン     VCR     注射     1.5mg/㎡     day2,8,15 day2,23     42日     8サイクル繰り返す VCR-最大2mg/body	(Packer B:ケモ前RT中)	VCK	/土分]	1.5IIIg/ III	uayı	7 🗆	VUN-取入ZIIIg/ DOUY
【BSA=1.0/㎡程度】       VCR CPA       注射 1.5mg/㎡ day22,8,15 day22,23       42日 8サイクル繰り返す VCR-最大2mg/body	Packer Bレジメン	CDDP		75mg/m²	day1		RT終了6週間後に開始
CPA 1.5mg/㎡ day22,23 VCR-最大2mg/body		VCR	注射	1.5mg/m²	day2,8,15	42日	8サイクル繰り返す
CBDCA+VCR 道 λ VCR 15mg/m² day1 8 15 22	【D3A-1.0/ III住反】	CPA		1.5mg/m²	day22,23		VCR-最大2mg/body
CBDCA+VCR 導入	CBDCA+VCR 導入	VCR	注射	1.5mg/m²	day1,8,15,22	28 □	VCR-是士2mg/body
1~4·7~10W CBDCA 7元93 175mg/㎡ day1,8,15,22 25日 VCK-最大2Hig/body	1~4 ⋅ 7~10W	CBDCA	江初	175mg/m²	day1,8,15,22	201	V GIV-取入ZIIIg/ body
CBDCA+VCR 導入 5~6W		VCR	注射	1.5mg/m²	day1,8	14日	VCR-最大2mg/body
GRDCA→VGD 【*##+ 床→】 VCR	CBDCA+VCR 【維持療法】	VCR	注射	1.5mg/m²	day1,8,15	49日	寛解導入終了2週後に開始
CBDCA+VCR 【維持療法】		CBDCA		175mg/m²	day1,8,15,22		12サイクル繰り返す
CBDCA 450mg/m day1	CARE(ETP200mgまで)	CBDCA	注射	450mg/m²	day1	28日	
CARE(ETP200mgまで)		ETP		150mg/m²	day1-3		
CARE/ETROOD 400 ) CBDCA 254 450mg/㎡ day1 20日 ETPを分割して投与	CARE(ETP200~400mg)	CBDCA	注射	450mg/m²	day1	28日	ETPを分割して投与
CARE(ETP200~400mg)		ETP		150mg/m²	day1-3		(溶解度の問題で)
ODT CLOD 2000 ETP 100mg/m day1-5	CPT-SIOP-2000 (ETP+VCR+CBDCA)	ETP		100mg/m²	day1-5		目上6417.4.4
I ICBDCA I注射 I350mg/m Idav1.2 I28日 I		CBDCA	注射	350mg/m²	day1,2	28日	最大6サイクル VCR-最大2mg/body
(ETP+VCR+CBDCA)		VCR		1.5mg/m²	day5		