

## 【悪性神経膠腫（成人）】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
TMZ注初発：RT併用期	TMZ	注射	75mg/m <sup>2</sup>	day1-14	14日	42日間投与後、4週間休薬 →TMZ単剤へ
BV+TMZ注初発 ：RT併用期：1・2週目	BV TMZ	注射 注射	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ注初発 ：RT併用期：3・4週目	BV TMZ	注射 注射	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ注初発 ：RT併用期：5・6週目	BV TMZ	注射 注射	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	13日	RT=週5日分割照射併用 RT併用期5・6週目(d29~41)
BV+TMZ注初発 ：RT併用期：7週目	BV TMZ	注射 注射	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	RT終了日 ~BV投与日	-日	RT終了日(d42~49)にBV投与 →4週間休薬
BV+TMZ内服初発 ：RT併用期：1・2週目	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ内服初発 ：RT併用期：3・4週目	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ内服初発 ：RT併用期：5・6週目	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	13日	RT=週5日分割照射併用 RT併用期5・6週目(d29~41)
BV+TMZ内服初発 ：RT併用期：7週目	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 (=RT終了日) ~BV投与日	-日	RT終了日(d42~49)にBV投与 →4週間休薬
BV+TMZ内服 ：初発維持・再発	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 150~200mg/m <sup>2</sup>	day1,15 day1-5	28日	初発維持は6サイクルまで
3週間隔 BV	BV	注射	15mg/kg	day1	21日	
2週間隔 BV	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	

## 【小児脳腫瘍】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
TMZ注 単独 150mg/m <sup>2</sup>	TMZ	注射	150mg/m <sup>2</sup>	day1-5	28日	
BV+TMZ注 単独 150mg/m <sup>2</sup>	BV TMZ	注射	10mg/kg 150mg/m <sup>2</sup>	day1,15 day1-5	28日	
BV+TMZ注 単独 200mg/m <sup>2</sup>	BV TMZ	注射	10mg/kg 200mg/m <sup>2</sup>	day1,15 day1-5	28日	
BV+TMZ内服初発 放射線併用1・2週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-14	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ内服初発 放射線併用3・4週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day15 day15-28	14日	RT=週5日分割照射併用
BV+TMZ内服初発 放射線併用5・6週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day29 day29-41	13日	RT=週5日分割照射併用 RT併用期5・6週目(d29~41)
BV+TMZ内服初発 放射線併用7週	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 75mg/m <sup>2</sup>	day1 (=RT終了日) ~BV投与日	-日	RT終了日(d42~49)にBV投与 →4週間休薬
BV+TMZ内服:初発維持・再発	BV TMZ	注射 内服	10mg/kg 150~200mg/m <sup>2</sup>	day1,15 day1-5	28日	6サイクル後BV単剤維持へ (BV 15mg/kg 21日)
3週間隔 BV	BV	注射	15mg/kg	day1	21日	
2週間隔 BV	BV	注射	10mg/kg	day1	14日	
SIOP-EP1(VCR+ETP+CPA)	VCR CPA ETP	注射	1.5mg/m <sup>2</sup> 3000mg/m <sup>2</sup> 100mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15 day1 day1-3	28日	VCR-最大2mg/body
RT+weekly VCR (Packer B:ケモ前RT中)	VCR	注射	1.5mg/m <sup>2</sup>	day1	7日	VCR-最大2mg/body
Packer Bレジメン 【BSA=1.0/m <sup>2</sup> 程度】	CDDP VCR CPA	注射	75mg/m <sup>2</sup> 1.5mg/m <sup>2</sup> 1.5mg/m <sup>2</sup>	day1 day2,8,15 day22,23	42日	RT終了6週間後に開始 8サイクル繰り返す VCR-最大2mg/body
CBDCA+VCR 導入 1~4・7~10W	VCR CBDCA	注射	1.5mg/m <sup>2</sup> 175mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15,22 day1,8,15,22	28日	VCR-最大2mg/body
CBDCA+VCR 導入 5~6W	VCR	注射	1.5mg/m <sup>2</sup>	day1,8	14日	VCR-最大2mg/body
CBDCA+VCR 【維持療法】	VCR CBDCA	注射	1.5mg/m <sup>2</sup> 175mg/m <sup>2</sup>	day1,8,15 day1,8,15,22	49日	寛解導入終了2週後に開始 12サイクル繰り返す
CARE(ETP200mgまで)	CBDCA ETP	注射	450mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-3	28日	
CARE(ETP200~400mg)	CBDCA ETP	注射	450mg/m <sup>2</sup> 150mg/m <sup>2</sup>	day1 day1-3	28日	ETPを分割して投与 (溶解度の問題で)
CPT-SIOP-2000 (ETP+VCR+CBDCA)	ETP CBDCA VCR	注射	100mg/m <sup>2</sup> 350mg/m <sup>2</sup> 1.5mg/m <sup>2</sup>	day1-5 day1,2 day5	28日	最大6サイクル VCR-最大2mg/body