

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫以外】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
R-ロイスタチン5日間(初回)	Rit 2CdA	注射	375mg/m ² 0.12mg/kg	day1 day2-6	28日	Rit初回投与速度
ロイスタチン5日間	2CdA	注射	0.12mg/kg	day1-5	28日	
ロイスタチン7日間持続	2CdA	注射	0.09mg/kg	day1-7	21日	
ベンダムスチン(添)	Benda	注射	120mg/m ²	day1-2	21日	
G-ベンダムスチン (2Day;2サイクル目~)	Benda OBI	注射	90mg/m ² 1000mg/body	day1-2 day1	28日	
G-ベンダムスチン (2Day;1サイクル目)	Benda OBI	注射	90mg/m ² 1000mg/body	day1-2 day1,8,15	28日	
Pola-BR(初回)	Benda Rit POL-V	注射	90mg/m ² 375mg/m ² 1.8mg/kg	day1-2 day1 day2	21日	Rit初回投与速度
Pola-BR(2回目以降)	Benda Rit POL-V	注射	90mg/m ² 375mg/m ² 1.8mg/kg	day1-2 day1 day2	21日	
R-ベンダムスチン (2Day;初回)	Rit Benda	注射	375mg/m ² 90mg/m ²	day1 day1-2	28日	Rit初回投与速度
R-ベンダムスチン (2Day;2回目以降)	Rit Benda	注射	375mg/m ² 90mg/m ²	day1 day1-2	28日	
CHASE-R(初回)	Rit CPA AraC ETP	注射	375mg/m ² 1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ²	day1 day2 day3-4 day2-4	21日	Rit初回投与速度
CHASE-R(2回目以降)	Rit CPA AraC ETP	注射	375mg/m ² 1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ²	day1 day2 day3-4 day2-4	21日	
CHASE	CPA AraC ETP	注射	1200mg/m ² 2000mg/m ² 100mg/m ²	day1 day2-3 day1-3	21日	
CHOP(PSL div)	CPA DXR VCR PSL	注射 注射 注射 注射	750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1 day1 day1 day1-5	21日	
G-CHOP(初回:2day) (PSL p.o.)	OBI CPA DXR VCR PSL	注射 注射 注射 注射 内服	1000mg/body 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1,8,15 day2 day2 day2 day1-5	21日	

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫以外】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
1日G-CHOP(2~6サイクル)	OBI CPA DXR VCR PSL	注射 注射 注射 注射 内服	1000mg/body 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
1日G-CHOP(初回)	OBI CPA DXR VCR PSL	注射 注射 注射 注射 内服	1000mg/body 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1,8,15 day1 day1 day1 day1-5	21日	
G-CHOP(7~8サイクル)	OBI	注射	1000mg/body	day1	21日	
R-CHOP(初回:2day) (PSL p.o.)	Rit CPA DXR VCR PSL	注射 注射 注射 注射 内服	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1 day2 day2 day2 day1-5	21日	Rit初回投与速度
1日R-CHOP(初回)	Rit CPA DXR VCR PSL	注射	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	Rit初回投与速度
1日R-CHOP(2回目以降)	Rit CPA DXR VCR PSL	注射	375mg/m ² 750mg/m ² 50mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/body	day1 day1 day1 day1 day1-5	21日	
DA-EPOCH (R) [Level 1]	ETP DXR VCR CPA PSL Rit	注射	50mg/m ² 10mg/m ² 0.4mg/m ² 750mg/m ² 60mg/m ² 375mg/m ²	day2-3 day2-3 day2-3 day6 day2-6 day1	21日	血球数により増・減あり (Level -1~3の用量設定)
DeVIC	DEX ETP IFO mesna CBDCA	注射	33mg/body 100mg/m ² 1500mg/m ² 900mg/m ² 300mg/m ²	day1-3 day1-3 day1-3 day1-3 day1	21日	
エプキンリ (1サイクル目)	EPC	注射	0.18mg/body 0.8mg/body 48mg/body	day1 day8 day15,22	28日	投与日~投与後3日目まで CRS軽減させる薬剤必須

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫以外】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
エプキンリ (2~3サイクル目)	EPC	注射	48mg/body	day1.8.15.22	28日	状況によってCRS軽減させる 薬剤あり 投与遅延条件(添付文書)満 たした場合、1サイクル目投 与方法で再開
エプキンリ (4~9サイクル目)	EPC	注射	48mg/body	day1.15	28日	
エプキンリ (10サイクル目以降)	EPC	注射	48mg/body	day1	28日	
ESHAP	ETP mPSL AraC CDDP	注射	40mg/m ² 250mg/body 2000mg/m ² 25mg/m ²	day1-4 day1-4 day5 day1-4	21日	
R-ESHAP(初回)	Rit ETP mPSL AraC CDDP	注射	375mg/m ² 40mg/m ² 250mg/body 2000mg/m ² 25mg/m ²	day1 day2-5 day2-5 day6 day2-5	21日	Rit初回投与速度
R-ESHAP(2回目以降)	Rit ETP mPSL AraC CDDP	注射	375mg/m ² 40mg/m ² 250mg/body 2000mg/m ² 25mg/m ²	day1 day2-5 day2-5 day6 day2-5	21日	
イストダックス	ROM	注射	14mg/m ²	day1,8,15	28日	
ガザイバ単剤(維持療法)	OBI	注射	1000mg/body	day1	56日	
ガザイバ：① 初回速度(IR対応用)	OBI	注射	1000mg/body	day1	7日	
ガザイバ：① 2回目速度(IR対応用)	OBI	注射	1000mg/body	day1	7日	
R-GDP(初回)	Rit GEM DEX CDDP	注射	375mg/m ² 1000mg/m ² 33mg/body 75mg/m ²	day1 day2,9 day2-5 day2	21日	Rit初回投与速度
R-GDP(2回目以降)	Rit GEM DEX CDDP	注射	375mg/m ² 1000mg/m ² 33mg/body 75mg/m ²	day1 day2,9 day2-5 day2	21日	
GDP	GEM DEX CDDP	注射	1000mg/m ² 33mg/body 75mg/m ²	day1,8 day1-4 day1	21日	
GEM(添)	GEM	注射	1000mg/m ²	day1,8,15	28日	

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫以外】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
R-MPV(初回)	Rit MTX VCR PCZ	注射 注射 注射 内服	375mg/m ² 3500mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/m ²	day1 day2 day2 day1-7 (※)	14日	Rit初回投与速度 ※1,3,5,(7)サイクル目のみ
R-MPV(2回目以降)	Rit MTX VCR PCZ	注射 注射 注射 内服	375mg/m ² 3500mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/m ²	day1 day2 day2 day1-7 (※)	14日	※1,3,5,(7)サイクル目のみ
HD-MTX	MTX	注射	3000mg/m ²	day1	14日	day0-4にハイドレーションあり MTX投与36時間後～ ロイコポリン開始
Pola+R-CHP (初回)	PSL DXR CPA POL-V Rit	注射	100mg/body 50mg/m ² 750mg/m ² 1.8mg/kg 375mg/m ²	day1-5 day1 day1 day2 day1	21日	Rit以外=6コースまで PSLd2-5：内服 or 注射 ※Rit初回投与速度
Pola+R-CHP (2～6サイクル目)	PSL DXR CPA POL-V Rit	注射	100mg/body 50mg/m ² 750mg/m ² 1.8mg/kg 375mg/m ²	day1-5 day1 day1 day1 day1	21日	Rit以外=6コースまで PSLd2-5：内服 or 注射
ジフォルタ	PRA	注射	30mg/m ²	day1,8,15,22,29,36	49日	パンビタン2g 連日服用 ビタミンB12 7週毎に投与
リツキシマブ(添)初回	Rit	注射	375mg/m ²	day1	7日	
リツキシマブ(添)2回目以降	Rit	注射	375mg/m ²	day1	7日	
リツキシマブ(添)維持療法	Rit	注射	375mg/m ²	day1	7日	
アドセトリス+CHP	BRE-V PSL DXR CPA	注射	1.8mg/kg 100mg/body 50mg/m ² 750mg/m ²	day1 day1-5 day1 day1	21日	【PTCL/未治療】 PSLd2-5：内服 or 注射
SMILE療法	MTX DEX ETP IFM L-ASP	注射	2000mg/m ² 33mg/body 100mg/m ² 1500mg/m ² 6000単位/m ²	day1 day2-3 day2-3 day2-3 day8,10,12,14 ,16,18,20	28日	【鼻型NK/Tリンパ腫】
R2療法 1サイクル目 (リツキシマブ+ブレベリマブ療法)	Rit Lnd	注射 内服	375mg/m ² 20mg/body	day1,8,15,22 day1-21	28日	【FL/MZL】 ※Rit初回投与速度
R2療法 2～5サイクル目	Rit Lnd	注射 内服	375mg/m ² 20mg/body	day1 day1-21	28日	【FL/MZL】

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫以外】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
レミトロ点滴静注	DENI-D	注射	9 μ g/kg	day1-5	21日	【PTCL/CTCL】 最大8サイクルまで
イムブルピカ+リツキシマブ (維持療法)	Rit lbr	注射 内服	375mg/m ² 560mg/body	day1 day1-56	56日	【MCL/未治療】 Ritは最大12サイクルまで 以降はlbr維持療法 ※lbr併用禁忌あり

【悪性リンパ腫(ML) - ホジキンリンパ腫】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ABVD	DXR BLM VBL DTIC	注射	25mg/m ² 10mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ²	day1,15 day1,15 day1,15 day1,15	28日	
C-MOPP	CPA VCR PCZ PSL	注射 注射 内服 内服	650mg/m ² 1.4mg/m ² 100mg/m ² 40~60mg/m ²	day1,8 day1,8 day1-14 day1-14	28日	
オプジーボ(添) 240mg q2W	NIVO	注射	240mg/body	day1	14日	
オプジーボ(添) 480mg q4W	NIVO	注射	480mg/body	day1	28日	
キイトルーダ(添) 200mg q3W	KEY	注射	200mg/body	day1	21日	
キイトルーダ(添) 400mg q6W	KEY	注射	400mg/body	day1	42日	
アドセトリス	BRE-V	注射	1.8mg/kg	day1	21日	【再発・難治性 CD30陽性HL 及びALCL】
アドセトリス+AVD	BRE-V DXR VLB DTIC	注射	1.2mg/kg 25mg/m ² 6mg/m ² 375mg/m ²	day1 day1 day1 day1	21日	【CD30陽性HL/未治療】 最大12サイクルまで

【成人T細胞白血病リンパ腫(ATL/L)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
mLSG15(Day1:VCAP)	VCR CPA DXR PSL	注射 注射 注射 内服	1mg/m ² 350mg/m ² 40mg/m ² 40mg/m ²	day1 day1 day1 day1	7日	VCRは最大2mgまで
mLSG15(Day8:AMP)	DXR MCNU PSL	注射 注射 内服	30mg/m ² 60mg/m ² 40mg/m ²	day8 day8 day8	7日	
mLSG15(Day15:VECP)	VDS ETP CBDCA PSL	注射 注射 注射 内服	2.4mg/m ² 100mg/m ² 250mg/m ² 40mg/m ²	day15 day15-17 day15 day15-17	7日	day18~28にG-CSF使用
髄注(MTX+AraC+PSL)	MTX AraC PSL	髄注	15mg/body 40mg/body 10mg/body	day1 day1 day1	1日	1,3,5サイクルの回復期に実施
ポテリジオ(8回まで)	Moga	注射	1mg/kg	day1	7日	8サイクルまで

【骨髄異形成症候群(MDS)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
アザシチジン皮下(添)	AZA	注射	75mg/m ²	day1-7	28日	
アザシチジン点滴(添)	AZA	注射	75mg/m ²	day1-7	28日	

【多発性骨髄腫(MM)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
BD療法 (2投1休 Day1,4,8,11)	Bor DEX	注射 内服	1.3mg/m ² 20mg/body	day1,4,8,11 day1,2,4,5,8,9,11,12	21日	DEX内服は Bor投与日のみでも可
BD療法 (4投1休 Day1,8,15,22)	Bor DEX	注射 内服	1.3mg/m ² 20mg/body	day1,8,15,22 day1,2,8,9,15,16,22,23	35日	DEX内服は Bor投与日のみでも可
Kd(1サイクル目)	CFZ	注射	20mg/m ²	day1,2	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	CFZ	注射	56mg/m ²	day8,9,15,16		
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16		
Kd(2サイクル目～)	CFZ	注射	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16		
Kd(週1回：1サイクル目)	CFZ	注射	20mg/m ²	day1	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	CFZ	注射	70mg/m ²	day8,15		
	DEX	内服	40mg/body	day1,8,15,22		
Kd(週1回：2サイクル目以降)	CFZ	注射	70mg/m ²	day1,8,15	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	DEX	内服	40mg/body	day1,8,15,22		
KRd(1サイクル目)	CFZ	注射	20mg/m ²	day1,2	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	CFZ	注射	27mg/m ²	day8,9,15,16		
	Lnd	内服	25mg/body	day1-21		
	DEX	内服	40mg/body	day1,8,15,22		
KRd(2～12サイクル目)	CFZ	注射	27mg/m ²	day1,2,8,9,15,16	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	Lnd	内服	25mg/body	day1-21		
	DEX	内服	40mg/body	day1,8,15,22		
KRd(13サイクル目～)	CFZ	注射	27mg/m ²	day1,2,15,16	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
	Lnd	内服	25mg/body	day1-21		
	DEX	内服	40mg/body	day1,8,15,22		
scDBd 1～3サイクル目	scD	注射	15mL/body	day1,8,15	21日	
	Bor	注射	1.3mg/m ²	day1,4,8,11		
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,4,8,11,12,1		
scDBd 4～8サイクル目	scD	注射	15mL/body	day1,8,15	21日	
	Bor	注射	1.3mg/m ²	day1,4,8,11		
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,4,8,11,12,1		
scDBd 9サイクル目～	scD	注射	15mL/body	day1	28日	
	DEX	内服	20mg/body	day1		
scDKd 1サイクル目	scD	注射	15mL/body	day1,8,15,22	28日	BSA2.2m ² 以上は2.2m ² として計算 ※day22のDEXは40mg/body
	CFZ	注射	20mg/m ²	day1,2		
	CFZ	注射	56mg/m ²	day8,9,15,16		
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,2		
scDKd 2サイクル目	scD	注射	15mL/body	day1,8,15,22	28日	BSA2.2m ² 以上は2.2m ² として計算 ※day22のDEXは40mg/body
	CFZ	注射	56mg/m ²	day1,2,8,9,15,16		
	DEX	内服	20mg/body	day1,2,8,9,15,16,2		

【多発性骨髄腫(MM)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
scDKd 3~6サイクル目	scD CFZ DEX	注射 注射 内服	15mL/body 56mg/m ² 20mg/body	day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,2	28日	BSA2.2m ² 以上は2.2m ² として計算 ※day22のDEXは40mg/body
scDKd 7サイクル目~	scD CFZ DEX	注射 注射 内服	15mL/body 56mg/m ² 20mg/body	day1 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9,15,16,2	28日	BSA2.2m ² 以上は2.2m ² として計算 ※day22のDEXは40mg/body
scDLd 1~2サイクル目	scD Lnd DEX	注射 内服 内服	15mL/body 25mg/body 20mg/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,2,8,9,15 ,16,22,23	28日	
scDLd3~6サイクル目	scD Lnd DEX	注射 内服 内服	15mL/body 25mg/body 20mg/body	day1,15 day1-21 day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
scDLd7サイクル目~	scD Lnd DEX	注射 内服 内服	15mL/body 25mg/body 20mg/body	day1 day1-21 day1,2,8,9,15,16,22,23	28日	
scDMPB 1サイクル目	Bor scD L-Pam PSL	注射 注射 内服 内服	1.3mg/m ² 15mL/body 9mg/m ² 60mg/m ²	day1,4,8,11 ,22,25,29,32 day1,8,15,22,29,36 day1-4 day2-4	42日	
scDMPB 2~9サイクル目	Bor scD L-Pam PSL	注射 注射 内服 内服	1.3mg/m ² 15mL/body 9mg/m ² 60mg/m ²	day1,8,22,29 day1,22 day1-4 day2-4	42日	
scDMPB 10サイクル目~	scD	注射	15mL/body	day1	28日	
scDPd 1~2サイクル目	scD Pom DEX	注射 内服 内服	15mL/body 4mg/body 20mg/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	75歳超=DEX 20mg/w可
scDPd 3~6サイクル目	scD Pom DEX	注射 内服 内服	15mL/body 4mg/body 20mg/body	day1,15 day1-21 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	75歳超=DEX 20mg/w可
scDPd 7サイクル目~	scD Pom DEX	注射 内服 内服	15mL/body 4mg/body 20mg/body	day1 day1-21 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	75歳超=DEX 20mg/w可

【多発性骨髄腫(MM)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ERd (1サイクル目)	ELO DEX DEX Lnd	注射 注射 内服 内服	10mg/kg 6.6mg/body 28mg/body 25mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28日	ELO day1は初回投与速度
ERd (2サイクル目)	ELO DEX DEX Lnd	注射 注射 内服 内服	10mg/kg 6.6mg/body 28mg/body 25mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28日	
ERd (3サイクル目～)	ELO DEX DEX Lnd	注射 注射 内服 内服	10mg/kg 6.6mg/body 28mg/body 25mg/body	day1,15 day1,15 day1,8,15,22 day1-21	28日	ELO非投与日のDEX内服は 40mg/body
EPd (1サイクル目)	ELO DEX DEX Pom	注射 注射 内服 内服	10mg/kg 6.6mg/body 28mg/body 4mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28日	ELOは初回投与速度 75歳超 = DEX内服 8mg/body
EPd (2サイクル目)	ELO DEX DEX Pom	注射 注射 内服 内服	10mg/kg 6.6mg/body 28mg/body 4mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1-21	28日	ELOは2回目投与速度 75歳超 = DEX内服 8mg/body
EPd (3サイクル目)	ELO DEX DEX Pom	注射 注射 内服 内服	20mg/kg 6.6mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1 day8,15,22 day1-21	28日	ELOは3回目投与速度 75歳超 = DEX内服 28→ 8mg、40→20mg/body
EPd (4サイクル目～)	ELO DEX DEX Pom	注射 注射 内服 内服	20mg/kg 6.6mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1 day8,15,22 day1-21	28日	ELOは4回目～投与速度 75歳超 = DEX内服 28→ 8mg、40→20mg/body
Isa-Kd (1サイクル目)	ISA CFZ CFZ DEX	注射 注射 注射 内服	10mg/kg 20mg/m ² 56mg/m ² 20mg/body	day1,8,15,22 day1,2 day8,9,15,16 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
Isa-Kd (2サイクル目以降)	ISA CFZ DEX	注射 注射 内服	10mg/kg 56mg/m ² 20mg/body	day1,15 day1,2,8,9,15,16 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	BSA2.2m ² 以上は 2.2m ² として計算
Isa-Pom-d (1サイクル目)	ISA Pom DEX	注射 内服 内服	10mg/kg 4mg/body 40mg/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,8,15,22	28日	75歳超 = DEX20mg/body

【多発性骨髄腫(MM)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
Isa-Pom-d (2サイクル目以降)	ISA Pom DEX	注射 内服 内服	10mg/kg 4mg/body 40mg/body	day1,15 day1-21 day1,8,15,22	28日	75歳超=DEX20mg/body
Isa-d (1サイクル目)	ISA DEX	注射 内服	20mg/kg 40mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22	28日	75歳超=DEX20mg/body
Isa-d (2サイクル目以降)	ISA DEX	注射 内服	20mg/kg 40mg/body	day1,15 day1,8,15,22	28日	75歳超=DEX20mg/body
PVd療法 (1~8サイクル目)	Bor Pom DEX	注射 内服 内服	1.3mg/m ² 4mg/body 20mg/body	day1,4,8,11 day1-14 day1,2,4,5 ,8,9,11,12	21日	75歳超=DEX10mg/body
PVd療法 (9サイクル以降)	Bor Pom DEX	注射 内服 内服	1.3mg/m ² 4mg/body 20mg/body	day1,8 day1-14 day1,2,4,5 ,8,9,11,12	21日	75歳超=DEX10mg/body
VRD (2投1休)	Bor Lnd DEX	注射 内服 内服	1.3mg/m ² 15-25mg/body 20mg/body	day1,4,8,11 day1-14 day1,2,4,5 ,8,9,11,12	21日	
VRD-lite 【導入：1~9サイクル】	Bor Lnd DEX	注射 内服 内服	1.3mg/m ² 15mg/body 20mg/body	day1,8,15,22 day1-21 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	35日	
VRD-lite 【地固め：10~16サイクル】	Bor Lnd	注射 内服	1.3mg/m ² 15mg/body	day1,15 day1-21	28日	
大量L-PAM (MEL 100×2)	L-Pam	注射	100mg/m ²	day1,2	2日	
WeeklyCyBorD療法	CPA Bor DEX	注射	300mg/m ² 1.5mg/m ² 40mg/body	day1 day1 day1	7日	DEXは内服でも可
CPA+Bor+PSL	CPA Bor PSL	注射	300mg/m ² 1.3mg/m ² 100mg/body	day1,4,8,11 day1,8,15,22 day1~27(1日おき)	28日	PSLは内服でも可

【急性リンパ性白血病(ALL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ALL202-O(25～65歳未満) 寛解導入療法	CPA DNR VCR L-ASP PSL	注射 注射 注射 注射 内服	1200mg/m ² 60mg/m ² 1.3mg/m ² 3000 U/m ² 60mg/m ²	day1 day1-3 day1,8,15,22 day9,11,13 ,16,18,20 day1-21→taper	35日	VCRは最大2mgまで
ALL202-O(25～65歳未満) 地固め①	Ara-C ETP DEX MTX DEX	注射 注射 注射 髄注 髄注	4g/m ² 100mg/m ² 40mg/body 15mg/body 4mg/body	day1-3 day1-3 day1-3 day1 day1	3日	Ara-C = 2g/m ² q12hrで投与
ALL202-O(25～65歳未満) 地固め②	MTX VCR 6-MP MTX DEX	注射 注射 内服 髄注 髄注	3g/m ² 1.3mg/m ² 25mg/m ² 15mg/body 4mg/body	day1,15 day1,15 day1-21 day1,15 day1,15	21日	VCRは最大2mgまで MTX後LVレスキュー
ALL202-O(25～65歳未満) 地固め③	VCR DXR DEX CPA 6-MP Ara-C MTX Ara-C DEX	注射 注射 内服 注射 内服 注射 髄注 髄注 髄注	1.3mg/m ² 30mg/m ² 10mg/m ² 1g/m ² 60mg/m ² 75mg/m ² 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1,8,15 day1,8,15 day1-8,15-22 day29 day29-42 day29-33,36-40 day1,29 day1,29 day1,29	42日	VCRは最大2mgまで
ALL202-O(25～65歳未満) 地固め④	Ara-C ETP DEX MTX DEX	注射 注射 注射 髄注 髄注	4g/m ² 100mg/m ² 40mg/body 15mg/body 4mg/body	day1-3 day1-3 day1-3 day1 day1	3日	Ara-C = 2g/m ² q12hrで投与
ALL202-O(25～65歳未満) 地固め⑤	MTX VCR 6-MP MTX DEX	注射 注射 内服 髄注 髄注	3g/m ² 1.3mg/m ² 25mg/m ² 15mg/body 4mg/body	day1,15 day1,15 day1-21 day1,15 day1,15	21日	VCRは最大2mgまで MTX後LVレスキュー
ALL202-O(25～65歳未満) 維持療法	VCR PSL MTX 6-MP	注射 内服 内服 内服	1.3mg/m ² 60mg/m ² 20mg/m ² 60mg/m ²	day1 day1-5 day1,8,15,22 day1-28	28日	VCRは最大2mgまで 寛解導入開始から満2年まで行う

【急性リンパ性白血病(ALL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ALL202Ph(+)寛解導入	CPA DNR VCR PSL Ima MTX Ara-C DEX	注射 注射 注射 内服 内服 髄注 髄注 髄注	1200mg/m ² 60mg/m ² 1,3mg/m ² 60mg/m ² 600mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1-3 day1,8,15,22 day1-21→taper day8-63 day29 day29 day29	63日	VCRは最大2mgまで 60~65歳=減量規定有
ALL202Ph(+)地固めC1	MTX Ara-C mPSL MTX Ara-C DEX	注射 注射 注射 髄注 髄注 髄注	1g/m ² 4g/m ² 100mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day2-3 day1-3 day1 day1 day1	5日	Ara-C = 2g/m ² q12hrで投与 mPSL = 50mg 1日2回で投与 地固めC1→C2を4回繰り返す MTX後LVレスキュー
ALL202Ph(+)地固めC2	Ima MTX Ara-C DEX	内服 髄注 髄注 髄注	600mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1-28 day1 day1 day1	28日	地固めC1→C2を4回繰り返す →終了後、維持療法へ
ALL202Ph(+)維持療法	VCR PSL Ima	注射 内服 内服	1,3mg/m ² 60mg/m ² 600mg/body	day1 day1-5 day1-28	28日	VCRは最大2mgまで 寛解から満2年まで繰り返す
ALL202-U(25歳未満) 寛解導入療法CNS(-)	VCR THP CPA L-ASP DEX PSL PSL MTX Ara-C HDC	注射 注射 注射 注射 注射 内服 内服 髄注 髄注 髄注	1,5mg/m ² 25mg/m ² 1200mg/m ² 6000 U/m ² 10mg/m ² 60mg/m ² 40mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day8,15,22,29 day8,9 day10 day16,18,20,23,23 ,25,27,30,32 day8-14 day1-7 day15-28→taper day1,8,22 day8,22 day8,22	35日	VCRは最大2mgまで

【急性リンパ性白血病(ALL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ALL202-U(25歳未満) 寛解導入療法CNS(+)	VCR THP CPA L-ASP DEX PSL PSL MTX Ara-C HDC	注射 注射 注射 注射 注射 内服 内服 髄注 髄注 髄注	1,5mg/m ² 25mg/m ² 1200mg/m ² 6000 U/m ² 10mg/m ² 60mg/m ² 40mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day8,15,22,29 day8,9 day10 day16,18,20,23,23 ,25,27,30,32 day8-14 day1-7 day15-28→taper day1,8,11,15,22 day8,11,15,22 day8,11,15,22	35日	VCRは最大2mgまで
ALL202-U(25歳未満) 強化療法	CPA THP Ara-C 6-MP MTX Ara-C HDC	注射 注射 注射 内服 髄注 髄注 髄注	750mg/m ² 25mg/m ² 75mg/m ² 50mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day1,8 day1,2 day1-6,8-13 day1-14 day1,8 day1,8 day1,8	28日	
ALL202-U(25歳未満) 聖域療法	MTX MTX Ara-C HDC	注射 髄注 髄注 髄注	3g/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day1,8 day2,9 day2,9 day2,9	14日	MTX後LVレスキュー
ALL202-U(25歳未満) 再寛解導入療法	VCR THP CPA L-ASP PSL MTX Ara-C HDC	注射 注射 注射 筋注 内服 髄注 髄注 髄注	1,5mg/m ² 25mg/m ² 1200mg/m ² 6000 U/m ² 40mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day1,8,15 day1,8 day1,8 day2,4,6,9,11,13 day1-14→taper day1 day1 day1	28日	VCRは最大2mgまで
ALL202-U(25歳未満) 再強化療法	CPA THP Ara-C 6-MP MTX Ara-C HDC	注射 注射 注射 内服 髄注 髄注 髄注	750mg/m ² 25mg/m ² 75mg/m ² 50mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day1,8 day1,2 day1-6,8-13 day1-14 day1,8 day1,8 day1,8	28日	

【急性リンパ性白血病(ALL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ALL202-U(25歳未満) 維持療法①CNS(-)	MTX 6-MP MTX Ara-C HDC	注射 内服 髄注 髄注 髄注	150mg/m ² 50mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day1,15,29 day1-28 day29 day29 day29	42日	
ALL202-U(25歳未満) 維持療法①'CNS(+)	MTX 6-MP MTX Ara-C HDC	注射 内服 髄注 髄注 髄注	150mg/m ² 50mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day29 day1-28 day1,8 day1,8 day1,8	42日	頭蓋内放射線照射あり (day1-11)
ALL202-U(25歳未満) 維持療法②	VCR CPA L-ASP PSL	注射 注射 筋注 内服	1.5mg/m ² 600mg/m ² 10000 U/m ² 40mg/m ²	day1,8,15 day8 day2,9,16 day1-14	28日	VCRは最大2mgまで
ALL202-U(25歳未満) 維持療法③	MTX 6-MP MTX Ara-C HDC	注射 内服 髄注 髄注 髄注	150mg/m ² 50mg/m ² 12mg/body 30mg/body 25mg/body	day29 day1-28 day29 day29 day29	42日	day29髄注 = CNS(-) の症例のみ投与
ALL202-U(25歳未満) 維持療法④	VCR THP L-ASP PSL	注射 注射 筋注 内服	1.5mg/m ² 25mg/m ² 10000 U/m ² 40mg/m ²	day1,8,15 day8 day2,9,16 day1-14	28日	VCRは最大2mgまで
ALL202用VDS	VDS	注射	3mg/m ²	day1	1日	最大4mgまで
ALL208Ph(+)寛解導入	CPA DNR VCR PSL Ima MTX Ara-C DEX	注射 注射 注射 内服 内服 髄注 髄注 髄注	1200mg/m ² 60mg/m ² 1.3mg/m ² 60mg/m ² 600mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1-3 day1,8,15,22 day1-21→taper day8-42 day29 day29 day29	42日	VCRは最大2mgまで 60~64歳=減量規定有
ALL208Ph(+)地固め①	MTX Ara-C mPSL mPSL Ima MTX Ara-C DEX	注射 注射 注射 内服 髄注 髄注 髄注	1g/m ² 4g/m ² 100mg/body 50mg/body 600mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day2-3 day1-3 day8,15 day4-21 day1 day1 day1	21日	Ara-C = 2g/m ² q12hrで投与 mPSL 100mg/body = 50mg 1日2回 60~64歳=減量規定有 地固めC1→C2を4回繰り返し MTX後LVレスキュー

【急性リンパ性白血病(ALL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
ALL208Ph(+)地固め②	CPA DNR VCR PSL Ima MTX Ara-C DEX	注射 注射 注射 内服 内服 髄注 髄注 髄注	1200mg/m ² 60mg/m ² 1.3mg/m ² 60mg/m ² 600mg/body 15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1 day1 day1-7→taper day2-21 day1 day1 day1	28日	VCRは最大2mgまで 地固めC1→C2を4回繰り返し →終了後、維持療法へ
ALL208Ph(+)維持療法	VCR PSL Ima	注射 内服 内服	1.3mg/m ² 60mg/m ² 600mgbody	day1 day1-5 day1-28	28日	VCRは最大2mgまで 寛解から満2年まで繰り返す
ビーリンサイト9μg/d 連日版 [①-Day1-7]	BLIN	注射	9μg/day	day1-7	7日	再発/難治Ph(-)B細胞ALL
ビーリンサイト28μg/d 連日版 [①-Day8以降]	BLIN	注射	28μg/day	day1-7	7日	45kg以上対象 ※45kg未満の場合、5 or 15 μg/m ² /dへ用量変更
ビーリンサイト9μg/d CAD/3日間版[①-Day1~7]	BLIN	注射	9μg/day	day1-3	3日	day1・①day8(=増量初日) のみDEX 20mg投与
ビーリンサイト9μg/d CAD/4日間版[①-Day1~7]	BLIN	注射	9μg/day	day1-4	4日	
ビーリンサイト28μg/d CAD/3日間版[①-Day8以降]	BLIN	注射	28μg/day	day1-3	3日	day1-28持続投与→2W休[導 入・地固め] or 8W休[維持] ※①day1~7のみ：9μg/d、 以降28μg/d
ビーリンサイト28μg/d CAD/4日間版[①-Day8以降]	BLIN	注射	28μg/day	day1-4	4日	※CADD=3日-4日交互適応
IO療法(寛解導入療法)	IO	注射	0.8mg/m ² 0.5mg/m ²	day1 day8,15	28日	再発/難治CD22(+)ALL ① 21日、②~ 28日/サイクル
IO療法(寛解後療法)	IO	注射	0.5mg/m ²	day1,8,15	28日	再発/難治CD22(+)ALL
髄注(MTX+AraC+DEX)	MTX Ara-C DEX	髄注	15mg/body 40mg/body 4mg/body	day1 day1 day1	1日	
髄注(MTX+DEX)	MTX DEX	髄注	15mg/body 4mg/body	day1 day1	1日	

【急性リンパ性白血病 または 悪性リンパ腫 (ALL/ML)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
HyperCVAD療法	CPA VCR DXR DEX MTX Ara-C	注射 注射 注射 注射 髄注 髄注	600mg/m ² 2mg/body 50mg/m ² 33mg/body 12mg/body 100mg/body	day1-3 day4,11 day4 day1-4,11-14 day2 day7	14日	MAと交互適応 CPA=300mg/m ² q12hrで投与 髄注=リスクに応じて総投与 回数変動あり mesna持続
MA療法	MTX Ara-C MTX Ara-C	注射 注射 髄注 髄注	1000mg/m ² 4g/m ² 12mg/body 100mg/body	day1 day2-3 day2 day7	7日	HyperCVADと交互適応 Ara-C=2g/m ² q12hrで投与 60歳以上=Ara-C減量あり 髄注=リスクに応じて総投与 回数変動あり MTX後LVレスキュー
髄注(MTX 12mg)	MTX	髄注	12mg/body	day1	1日	
髄注(AraC 100mg)	Ara-C	髄注	100mg/body	day1	1日	

【急性骨髄性白血病(AML)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
AML201-寛解導入IDR+AraC	IDR Ara-C	注射	12mg/m ² 100mg/m ²	day1-3 day1-7	7日	
AML201-寛解導入DNR+AraC	DNR Ara-C	注射	50mg/m ² 100mg/m ²	day1-5 day1-7	7日	
AML201-地固めHD-AraC	Ara-C	注射	4g/m ²	day1-5	5日	Ara-C=2g/m ² q12hrで投与
AML201-地固め①MIT+AraC	MIT Ara-C	注射	7mg/m ² 200mg/m ²	day1-3 day1-5	5日	
AML201-地固め②DNR+AraC	DNR Ara-C MTX Ara-C PSL	注射 注射 髄注 髄注 髄注	50mg/m ² 100mg/m ² 15mg/body 40mg/body 10mg/body	day1-3 day1-5 血球回復次第 血球回復次第 血球回復次第	5日	
AML201-地固め③ACR+AraC	ACR Ara-C	注射	20mg/m ² 200mg/m ²	day1-5 day1-5	5日	
AML201-地固め④AtripleV	Ara-C ETP VCR VDS	注射	200mg/m ² 100mg/m ² 0.8mg/m ² 2mg/m ²	day1-5 day1-5 day8 day10	10日	
髄注(MTX+AraC+PSL)	MTX Ara-C PSL	髄注	15mg/body 40mg/body 10mg/body	day1 day1 day1	1日	
アザシチジン皮下(添)	AZA	皮下	75mg/m ²	day1-7	28日	
アザシチジン点滴(添)	AZA	注射	75mg/m ²	day1-7	28日	
アザシチジン皮下 +ベネクレクタ	AZA Ven	皮下 内服	75mg/m ² 添付文書用量	day1-7 day1-28	28日	Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり
アザシチジン点滴 +ベネクレクタ	AZA Ven	注射 内服	75mg/m ² 添付文書用量	day1-7 day1-28	28日	Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり
CA(G)療法(AraC皮下)	Ara-C ACR	皮下 注射	20mg/m ² 14mg/m ²	day1-14 day1-4	14日	Ara-C=10mg/m ² q12hr
CA(G)療法(AraC持続点滴)	Ara-C ACR	注射	20mg/m ² 14mg/m ²	day1-14 day1-4	14日	
GO療法(分割)	GO	注射	3mg/m ²	day1,4,7	14日	
低用量AraC(皮下)	Ara-C	皮下	20mg/m ²	day1-7	7日	Ara-C=10mg/m ² q12hr
低用量AraC(持続点滴)	Ara-C	点滴	20mg/m ²	day1-7	7日	
低用量AraC(持続点滴) +ベネクレクタ	Ara-C Ven	注射 内服	20mg/m ² 添付文書用量	day1-10 day1-28	28日	Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり
低用量AraC(皮下) +ベネクレクタ	Ara-C Ven	皮下 内服	20mg/m ² 添付文書用量	day1-10 day1-28	28日	Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり

【急性骨髄性白血病(AML)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
MEC(再寛解導入)	MIT ETP Ara-C	注射	20mg/m ² 100mg/m ² 100mg/m ²	day1-3 day1-5 day1-7	7日	

【急性前骨髄球性白血病(APL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
APL204-寛解導入① IDR2+AraC5	ATRA IDR Ara-C	内服 注射 注射	45mg/m ² 12mg/m ² 100mg/m ²	day1～ day1-2 day1-5	5日	ATRA=地固め①前日まで (最長60日間)
APL204-寛解導入② IDR3+AraC7	ATRA IDR Ara-C	内服 注射 注射	45mg/m ² 12mg/m ² 100mg/m ²	day1～ day1-3 day1-7	7日	ATRA=地固め①前日まで (最長60日間)
APL204-地固め① MIT+AraC	MIT Ara-C	注射	7mg/m ² 200mg/m ²	day1-3 day1-5	5日	
APL204-地固め② DNR+AraC	DNR Ara-C	注射	50mg/m ² 200mg/m ²	day1-3 day1-5	5日	
APL204-地固め③ IDR+AraC	IDR Ara-C	注射	12mg/m ² 140mg/m ²	day1-3 day1-5	5日	
APL205R(ATO+IDR) 寛解導入①	ATO IDR	注射	0.15mg/kg 12mg/m ²	day1～ day1-2	5日	ATO=最大60日間
APL205R(ATO) 寛解導入療法②(D8～)	ATO	注射	0.15mg/kg	day1-7	7日	ATO=最大60日間
髄注(MTX+AraC+PSL)	MTX Ara-C PSL	髄注	15mg/body 40mg/body 10mg/body	day1 day1 day1	1日	
APL205R(ATO)地固め①②	ATO	注射	0.15mg/kg	day1-5	5日	day35まで5投2休/W繰り返し
APL205R(AraC)地固め③	Ara-C	注射	4g/m ²	day1-5	5日	Ara-C=2g/m ² q12hrで投与
APL406(ATO+ATRA) 地固め	ATO ATRA	注射 内服	0.15mg/kg 45mg/m ²	day1-5,8-12 ,15-19,22-26 day1-14	56日	
APL406(ATO+ATRA) 寛解導入	ATO ATRA	注射 内服	0.15mg/kg 45mg/m ²	day1～ day1～	7日	最大60日間まで継続

【慢性リンパ性白血病(CLL)】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
トレアキシン(添)	Benda	注射	100mg/m ²	day1-2	28日	
VenR(R 初回)	Rit Ven	注射 内服	375mg/m ² 400mg/body	day1 day1-28	28日	R=Ven用量漸増完了後開始 6回まで Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり
VenR(R 2回目以降)	Rit Ven	注射 内服	500mg/m ² 400mg/body	day1 day1-28	28日	R=Ven用量漸増完了後開始 6回まで Ven=CYP3A阻害薬併用で 用量変動あり

【その他】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
MEAM	MCNU ETP Ara-C L-pam	注射	300mg/m ² 200mg/m ² 400mg/m ² 140mg/m ²	day(-6) day(-5)-(-2) day(-5)-(-2) day(-1)	6日	【HL/移植前処置】 移植日 = day0で表記 ETP・Ara-C=q12hr分割投与
ETP+CyA+PSL	ETP CyA PSL	注射 内服 内服	150mg/m ² 3mg/kg 1mg/kg	day1 day1-7 day1-7	7日	【ウイルス感染性HPS】 PSL=注射でも可 ※最大8クール
リツキシマブ(添)初回	Rit	注射	375mg/m ²	day1	7日	【ITP/TTP】 Rit初回投与速度
リツキシマブ(添)2回目以降	Rit	注射	375mg/m ²	day1	7日	【ITP/TTP】 4サイクルまで
ソリリス(1~4週目まで)	ECZ	注射	600mg/body	day1	7日	【PNH/18歳以上】
ソリリス(5週目以降)	ECZ	注射	900mg/body	day1	14日	【PNH/18歳以上】
ユルトミリスHI初回 (40~60kg未満)	RAV	注射	2400mg/body	day1	14日	【PNH】
ユルトミリスHI初回 (60~100kg未満)	RAV	注射	2700mg/body	day1	14日	【PNH】
ユルトミリスHI初回 (100kg~)	RAV	注射	3000mg/body	day1	14日	【PNH】
ユルトミリスHI 2回目~ (40~60kg未満)	RAV	注射	3000mg/body	day1	56日	【PNH】
ユルトミリスHI 2回目~ (60~100kg未満)	RAV	注射	3300mg/body	day1	56日	【PNH】
ユルトミリスHI 2回目~ (100kg~)	RAV	注射	3600mg/body	day1	56日	【PNH】
CAD 初回(75kg以上)	SUT	注射	7.5g/body	day1	7日	【CAD/75kg以上】 2回目~=q2W
アクテムラ 2W	TCZ	注射	8mg/kg	day1	14日	【キャスルマン病】
アクテムラ 1W	TCZ	注射	8mg/kg	day1	7日	【キャスルマン病】
移植CY+BUS① (D-7~-1)	BUS CPA	注射	0.8mg/kg/回 60mg/kg	day(-7)10時~ q6hr 計16回 day(-3)-(-2)	7日	【移植】 移植日 = day0で表記 day(-1)~CyA開始 mesna投与
移植CY+BUS② (D0~11)	MTX MTX	注射	10mg/m ² 7mg/m ²	day1 day3,6,11	12日	【移植】 移植日 = day0で表記 CyA=別オーダー
移植CY+BUS前髄注	MTX PSL	髄注	15mg/body 10mg/body	day1	1日	

【その他】

レジメン名称	使用薬剤	投与経路	投与量	投与日	1クール	備考
再移植CY+Flu① (D-5~-1)	FLU CPA	注射	30mg/m ² 30mg/kg	day(-5)-(-2) day(-3)-(-2)	5日	【移植】 移植日 = day0で表記 day(-1)~CyA開始 mesna投与
再移植CY+Flu② (D0~11)	MTX MTX	注射	10mg/m ² 7mg/m ²	day1 day3,6,11	12日	【移植】 移植日 = day0で表記 CyA=別オーダー
Dara-CyBorD (1-2サイクル目)	scD Bor CPA DEX	皮下 皮下 注射 内服	15mL/body 1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body	day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,8,15,22 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	【全身性ALアミロイドーシス】 CPA=最大500mg/body DEX=70歳超、過少体重 etc=20mg/W可
Dara-CyBorD (3-6サイクル目)	scD Bor CPA DEX	皮下 皮下 注射 内服	15mL/body 1.3mg/m ² 300mg/m ² 20mg/body	day1,15 day1,8,15 day1,8,15,22 day1,2,8,9 ,15,16,22,23	28日	【全身性ALアミロイドーシス】 CPA=最大500mg/body DEX=70歳超、過少体重 etc=20mg/W可
Dara-CyBorD (7サイクル目以降)	scD DEX	皮下 内服	15mL/body 20mg/body	day1 day1	28日	【全身性ALアミロイドーシス】